

مبادئ الإحصاء 140

140	رقم ورمز المقرر
مبادئ الإحصاء	اسم المقرر
3	عدد وحدات المقرر
بدون	المتطلب السابق
بدون	المقرر المعادل
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.	المستفيد من المقرر
الإحصاء الوصفي - تصنيف بيان إحصائي - مقاييس النزعة المركزية - مقاييس التشتت - الارتباط الخطي البسيط وأنواعه - الانحدار .	تعريف ووصف المقرر (محتويات مختصرة)
محتويات تفصيلية مرفقة .	الموضوعات الرئيسية
توضيح دور الإحصاء في تخفيض الجهود التي تنظمها الدراسات العلمية عن طريق اختزال البيانات مع الاحتفاظ بالمعلومات المهمة التي تتضمنها . التطرق الى المفاهيم التالية :- وصف البيانات بيانيا وكميا - مصطلحي العينة والمجتمع بالإضافة إلى الطبيعة التكرارية للمسألة الإحصائية- طبيعة وكنه المسألة الإحصائية ودور الإحصاء فيها-	أهداف المقرر
محاضرات نظرية وتمارين .	طرق تدريس المقرر
عنوان الكتاب: الإحصاء النظرية والتطبيق .	اسم الكتاب المقرر
اسم المؤلف: د.علي العماري - د. علي العجيلي	
1- الإحصاء والاحتمالات- د. عبد الله زيدان	المراجع الرئيسية
2- محمد صبحي أبو صالح وعدنان عوض (1983) - مقدمة في الإحصاء - نيويورك - وايلي.	

وفيما يلي تفصيل لمحتويات المقرر:

<p style="text-align: right;"><u>المقدمة :</u></p> <p>نبذة عن علم الإحصاء - تعريف علم الإحصاء - المجتمع و العينة -البيانات - المعلمة - المتغير</p>	<p>الموضوعات الرئيسية (محتويات تفصيلية)</p>
<p style="text-align: right;"><u>تنظيم البيانات و عرضها :</u></p> <p>- تنظيم البيانات و تلخيصها و عرضها جدوليا - البيانات الوصفية - البيانات الكمية.</p> <p>- العرض البياني : المدرج التكراري - المضلع التكراري - المنحنى التكراري المتجمع الصاعد .</p>	
<p style="text-align: right;"><u>مقاييس النزعة المركزية :</u></p> <p>- مقدمة - رمز التجميع Σ .</p> <p>الوسط الحسابي - الوسط المرجح، الوسيط، المنوال، الربيعات - العشيرتات- المئينات.</p> <p>- بعض عيوب و مميزات المقاييس السابقة .</p>	
<p style="text-align: right;"><u>مقاييس التشتت :</u></p> <p>المدى، نصف المدى الربيعي، التباين و الانحراف المعياري، معامل الاختلاف، مميزات و عيوب مقاييس التشتت.</p>	
<p>الارتباط الخطي البسيط أنواعه (معامل ارتباط بيرسون - معامل ارتباط سبيرمان) الانحدار الخطي البسيط ويشمل (معادلة انحدار x علي y . معادلة انحدار y علي x) (</p>	

هذا المنهج يعتبر مساعد للكتاب المذكور
والأفضل اقتناء الكتاب (الإحصاء النظرية والتطبيق) للدكتور علي العجيلي -
وعلي العماري - موجود هذا الكتاب في مبيعات جامعة طرابلس

الفصل الأول التعريف بعلم الإحصاء

1/1 مقدمة

من المفاهيم الشائعة بين الناس عن الإحصاء، ما هي إلا أرقام وبيانات رقمية فقط، كأعداد السكان، وأعداد المواليد، وأعداد الوفيات، وأعداد المزارعين، وأعداد المزارع، وخلافه، ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن الإحصاء بأنه عد أو حصر الأشياء والتعبير عنها بأرقام، وهذا هو المفهوم المحدود لعلم الإحصاء، ولكن الإحصاء كعلم، هو الذي يهتم بطرق جمع البيانات، وتبويبها، وتلخيصها بشكل يمكن الاستفادة منها في وصف البيانات وتحليلها للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد.

2/1 وظائف علم الإحصاء

من التعريف السابق يمكن تحديد أهم وظائف علم الإحصاء في الآتي:

- 1- وصف البيانات Data Description
- 2- الاستدلال الإحصائي Statistical Inference
- 3- التنبؤ Forecasting

أولاً: وصف البيانات

تعتبر طريقة جمع البيانات وتبويبها وتلخيصها من أهم وظائف علم الإحصاء، إذ لا يمكن الاستفادة من البيانات الخام، ووصف الظواهر المختلفة محل الاهتمام، إلا إذا تم جمع البيانات وعرضها في شكل جدلي، أو بياني من ناحية، وحساب بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة التي تدلنا على طبيعة البيانات من ناحية أخرى.

ثانياً: الاستدلال الإحصائي

وهو أيضاً من أهم الوظائف المستخدمة في مجال البحث العلمي، ويستند الاستدلال الإحصائي على فكرة اختيار جزء من المجتمع يسمى عينة بطريقة علمية مناسبة، بغرض استخدام بيانات هذه العينة في التوصل إلى نتائج، يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة، ومن ثم يهتم الاستدلال الإحصائي بموضوعين هما:

- 1- التقدير Estimate: وفيه يتم حساب مؤشرات من بيانات العينة تسمى إحصاء Statistics تستخدم كتقدير لمؤشرات المجتمع وتسمى معالم Parameters، ويطلق على المقاييس الإحصائية المحسوبة من بيانات العينة في هذه الحالة بالتقدير بنقطة Point Estimate، كما

يمكن أيضا استخدام المقاييس الإحصائية المحسوبة من بيانات العينة في تقدير المدى الذي يمكن أن يقع داخله معلمة المجتمع باحتمال معين، ويسمى ذلك التقدير بفترة Interval Estimate.

2 - اختبارات الفروض Tests of Hypotheses: وفيه يتم استخدام بيانات العينة للوصول إلى قرار علمي سليم بخصوص الفروض المحددة حول معالم المجتمع.

ثالثا: التنبؤ

وفيه يتم استخدام نتائج الاستدلال الإحصائي، والتي تدلنا على سلوك الظاهرة في الماضي في معرفة ما يمكن أن يحدث لها في الحاضر والمستقبل. وهناك العديد من الأساليب الإحصائية المعروفة التي تستخدم في التنبؤ، ومن أبسطها أسلوب الاتجاه العام، وهي معادلة رياضية يتم تقدير معاملاتهما باستخدام بيانات العينة، ثم بعد ذلك استخدام المعادلة المقدرة في التنبؤ بما يمكن أن يحدث للظاهرة في المستقبل.

3/1 أنواع البيانات وطرق قياسها

من التعريف السابق لعلم الإحصاء، يلاحظ أنه العلم الذي يهتم بجمع البيانات Data، ونوع البيانات، وطريقة قياسها من أهم الأشياء التي تحدد التحليل الإحصائي المستخدم، وللبيانات أنواع تختلف في طريقة قياسها، ومن الأمثلة على ذلك: بيانات النوع (ذكور Male - إناث Female)، وبيانات تقدير الطالب ($A-A^+ - B-B^+ - C-C^+ - D-D^+$)، وبيانات عن درجة الحرارة اللازمة لحفظ الدجاج فترة زمنية معينة، وبيانات عن حجم الإنفاق العائلي بالألف ريال خلال الشهر. ومن هذه الأمثلة نجد أن بيانات النوع غير رقمية، بينما بيانات تقدير الطالب بيانات رقمية موضوعة في شكل مستويات أو فئات، أما بيانات كل من درجة الحرارة، وحجم الإنفاق العائلي فهي بيانات رقمية، ومن ثم يمكن تقسيم البيانات إلى مجموعتين هما:

1 - البيانات الوصفية Qualitative Data

2 - البيانات الكمية Quantitative Data

أولا: البيانات الوصفية

هي بيانات غير رقمية، أو بيانات رقمية مرتبة في شكل مستويات أو في شكل فئات رقمية، ومن ثم تقاس البيانات الوصفية بمعاييرين هما:

أ - بيانات وصفية مقاسة بمعيار اسمي Nominal Scale: وهي بيانات غير رقمية تتكون من مجموعات متنافية، كل مجموعة لها خصائص تميزها عن المجموعة الأخرى، كما أن هذه المجموعات لا يمكن المفاضلة بينها، ومن الأمثلة على ذلك:

- النوع: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي " ذكر - أنثى " .
- الحالة الاجتماعية: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي " متزوج - أعزب - أرمل - مطلق " .

- أصناف التمور: متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي " برحي . خلاص . سكري".
- الجنسية: متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي " سعودي . غير سعودي" وهذا النوع من البيانات يمكن تكويد مجموعاته بأرقام، فمثلا الجنسية يمكن إعطاء الجنسية "سعودي" الكود (1)، والجنسية "غير سعودي" الكود (2)
- ب بيانات وصفية مقاسة بمعيار ترتيبي Ordinal Scales: وتتكون من مستويات، أو فئات يمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا، ومن الأمثلة على ذلك:
 - تقدير الطالب: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي "D-D⁺-C-C⁺-B-B⁺-A-A⁺"
 - المستوى التعليمي: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي "أمي - يقرأ ويكتب . ابتدائية . متوسطة . ثانوية . جامعية . أعلى من جامعية "
 - تركيز خلات الصوديوم المستخدم في حفظ لحوم الدجاج من البكتريا: متغير وصفي ترتيبي يقاس بياناته بمعيار ترتيبي " 0% . 5% . 10% . 15%"
 - فئات الدخل العائلي في الشهر بالريال " <5000 ، 5000-10000 ، 10000-15000 ، 15000-20000 ، >20000 ."

ثانيا: البيانات الكمية

- هي بيانات يعبر عنها بأرقام عددية تمثل القيمة الفعلية للظاهرة، وتنقسم إلى قسمين هما:
- أ - بيانات فترة Interval Data: وهي بيانات رقمية، تقاس بمقدار بعدها عن الصفر، أي أن للصفر دلالة على وجود الظاهرة، ومن أمثلة ذلك:
 - درجة الحرارة: متغير كمي تقاس بياناته بمعيار بعدي، حيث أن درجة الحرارة "0°" ليس معناه انعدام الظاهرة، ولكنه يدل على وجود الظاهرة.
 - درجة الطالب في الاختبار: متغير كمي يقاس بياناته بمعيار بعدي، حيث حصول الطالب على الدرجة "0" لا يعني انعدم مستوى الطالب.
 - ب بيانات نسبية Ratio Data: هي متغيرات كمية، تدل القيمة "0" على عدم وجود الظاهرة ومن الأمثلة على ذلك:
 - إنتاجية الفدان بالطن/هكتار.
 - المساحة المنزرعة بالأعلاف بالدونم.
 - كمية الألبان التي تنتجها البقرة في اليوم.
 - عدد مرات استخدام المزرعة لنوع معين من الأسمدة.
 - عدد الوحدات المعيبة من إنتاج المزرعة.
- ويلاحظ أن بيانات الفترة لا يمكن إخضاعها للعمليات الحسابية مثل عمليات الضرب والقسمة، بينما يمكن فعل ذلك مع البيانات النسبية.

4/1 طرق جمع البيانات

تعتبر طريقة جمع البيانات من أهم المراحل التي يعتمد عليها البحث الإحصائي، كما أن جمع البيانات بأسلوب علمي صحيح، يترتب عليه الوصول إلى نتائج دقيقة في التحليل، ولدراسة طرق جمع البيانات، يجب الإلمام بالنقاط التالية:

- 1 -مصادر البيانات. 2- أسلوب جمع البيانات.
- 3 -أنواع العينات 4- وسائل جمع البيانات.

1/4/1 مصادر جمع البيانات

هناك مصدرين للحصول منها على البيانات هما:

- 1- المصادر الأولية.
- 2- المصادر الثانوية.

أولاً: المصادر الأولية: وهي المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل مباشر، حيث يقوم الباحث نفسه بجمع البيانات من المفردة محل البحث مباشرة، فعندما يهتم الباحث بجمع بيانات عن الأسرة، يقوم بإجراء مقابلة مع رب الأسرة، ويتم الحصول منه مباشرة على بيانات خاصة بأسرته، مثل بيانات المنطقة التابع لها، والحي الذي يسكن فيه، والحسنية، والمهنة، والدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، ... وهكذا. ويتميز هذا النوع من المصادر بالدقة والثقة في البيانات، لأن الباحث هو الذي يقوم بنفسه بجمع البيانات من المفردة محل البحث مباشرة، ولكن أهم ما يعاب عليها أنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير، ومن ناحية أخرى أنها مكلفة من الناحية المادية.

ثانياً: المصادر الثانوية: وهي المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل غير مباشر، بمعنى آخر يتم الحصول عليها بواسطة أشخاص آخرين، أو أجهزة، وهيئات رسمية متخصصة، مثل نشرات وزارة الزراعة، ونشرات مصلحة الإحصاء، ونشرات منظمة الأغذية " الفاو".... وهكذا.

ومن مزايا هذا النوع من المصادر، توفير الوقت والجهد والمال، إلا أن درجة ثقة الباحث فيها ليست بنفس الدرجة في حالة المصادر الأولية.

2/4/1 أسلوب جمع البيانات

يتحدد الأسلوب المستخدم في جمع البيانات، حسب الهدف من البحث، وحجم المجتمع محل البحث، وهناك أسلوبين لجمع البيانات هما:

- 1 -أسلوب الحصر الشامل.
- 2- أسلوب المعاينة.

أولاً: أسلوب الحصر الشامل: يستخدم هذا الأسلوب إذا كان الغرض من البحث هو

حصر جميع مفردات المجتمع، وفي هذه الحالة يتم جمع بيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع بلا استثناء، كحصر جميع المزارع التي تنتج التمور، أو حصر البنوك الزراعية في المملكة، ويتميز أسلوب الحصر الشامل بالشمول وعدم التحيز، ودقة النتائج، ولكن يعاب عليه أنه يحتاج إلى الوقت والمجهود، والتكلفة العالية.

ثانياً: أسلوب المعاينة: يعتم هذا الأسلوب على معاينة جزء من المجتمع محل الدراسة، يتم اختياره بطريقة علمية سليمة، ودراسته ثم تعميم نتائج العينة على المجتمع، ومن ثم يتميز هذا الأسلوب بالآتي:

- 1 - تخفيف الوقت والجهد.
 - 2 - تقليل التكلفة.
 - 3 - الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وخاصة إذا جمعت البيانات من خلال استمارة استبيان.
 - 4 - كما أن أسلوب المعاينة يفضل في بعض الحالات التي يصعب فيها إجراء حصر شامل، مثل معاينة دم المريض، أو إجراء تعداد لعدد الأسماك في البحر، أو معاينة اللمبات الكهربائية.
- ولكن يعاب على أساليب المعاينة: أن النتائج التي تعتمد على هذا الأسلوب أقل دقة من نتائج أسلوب الحصر الشامل، وخاصة إذا كانت العينة المختارة لا تمثل المجتمع تمثيلاً جيداً.


3/4/1 أنواع العينات

لكي نستعرض أنواع العينات، يتم أولاً تحديد الفرق بين مجتمع الدراسة، والعينة المسحوبة من هذا المجتمع.

- أ - المجتمع: هو مجموعة من المفردات التي تشترك في صفات، وخصائص محددة، ومجتمع الدراسة هو الذي يشمل جميع مفردات الدراسة، أي هو الكل الذي نرغب دراسته، مثل مجتمع مزارع إنتاج الدواجن، أو مجتمع طلاب الصف الثالث الثانوي.
- ب - العينة: هو جزء من المجتمع يتم اختياره بطرق مختلفة بغرض دراسة هذا المجتمع.

شكل رقم (1)

الفرق بين المجتمع والعينة




عينة الدراسة

مجتمع الدراسة

ويتوقف نجاح استخدام أسلوب المعاينة على عدة عوامل هي:
1 -كيفية تحديد حجم العينة. **2**- طريقة اختيار مفردات العينة **3**- نوع العينة المختارة.

ويمكن تقسيم العينات وفقا لأسلوب اختيارها إلى نوعين هما:



شكل رقم (2)

أولاً: العينات الاحتمالية

هي العينات التي يتم اختيار مفرداتها وفقا لقواعد الاحتمالات، بمعنى آخر هي التي يتم اختيار مفرداتها من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، بهدف تجنب التحيز الناتج عن اختيار المفردات، ومن أهم أنواع العينات الاحتمالية، ما يلي:

- أ - العينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample.
- ب - العينة العشوائية الطبقية Stratified Random Sample.
- ت - العينة العشوائية المنتظمة Systematic Random Sample.
- ث - العينة العنقودية أو المتعددة المراحل Cluster Sample.

ثانياً: العينات غير الاحتمالية

هي التي يتم اختيار مفرداتها بطريقة غير عشوائية، حيث يقوم الباحث باختيار مفردات العينة بالصورة التي تحقق الهدف من المعاينة، مثل اختيار عينة من المزارع التي تنتج التمور من النوع السكري، وأهم أنواع العينات غير الاحتمالية:

- أ - العينة العمدية Judgmental Sample
- ب - العينة الحصصية Quota Sample

الفصل الثاني طرق عرض البيانات

1/2 مقدمة

الخطوة التالية بعد جمع البيانات في مجال الإحصاء الوصفي، هو تبويب البيانات وعرضها بصورة يمكن الاستفادة منها في وصف الظاهرة محل الدراسة، من حيث تمركز البيانات، ودرجة تجانسها. وهناك طريقتين لعرض البيانات هما:

1 عرض البيانات جدولياً.

2 عرض البيانات بيانياً.

2/2 عرض البيانات جدولياً

يمكن عرض البيانات في صورة جدول تكراري، ويختلف شكل الجدول طبقاً لنوع البيانات، وحسب عدد المتغيرات، وفيما يلي عرض بيانات متغير (وصفي أو كمي) في شكل جدول تكراري بسيط.

1/2/2 عرض بيانات المتغير الوصفي في شكل جدول تكراري بسيط

إذا كنا بصدد دراسة ظاهرة ما تحتوي على متغير وصفي واحد، فإنه يمكن عرض بياناته في شكل جدول تكراري بسيط، وهو جدول يتكون من عمودين، أحدهما به مستويات (مجموعات) المتغير، والثاني به عدد المفردات (التكرارات) لكل مستوى (مجموعة).

والمثال التالي يبين لنا كيف يمكن تبويب البيانات الوصفية الخام في شكل جدول تكراري.

مثال (1-2)

فيما يلي بيانات عينة من 40 مزرعة عن نوع التمر الذي تنتجه المزرعة.

سكري	خلاص	برحي	خلاص	برحي	خلاص	برحي	سكري
برحي	سكري	برحي	صقعي	خلاص	برحي	نبوت سيف	برحي
صقعي	برحي	سكري	خلاص	برحي	برحي	صقعي	خلاص
برحي	خلاص	برحي	سكري	نبوت سيف	صقعي	نبوت سيف	صقعي
خلاص	برحي	صقعي	نبوت سيف	سكري	برحي	صقعي	خلاص

والمطلوب:

1 - ما هو نوع المتغير؟، وما هو المعيار المستخدم في قياس البيانات؟.

2 - عرض البيانات في شكل جدول تكراري.

3 - كون التوزيع التكراري النسبي.

4 - علق على النتائج.

الحل

1 - نوع التمر (سكري - خلاص - برحي - صقعي - نبوت سيف) متغير وصفي، تقاس بياناته بمعياري اسمي.

2 - لعرض البيانات في شكل جدول تكراري، يتم إتباع الآتي:

• تكوين جدول تفرغ البيانات:

وهو جدول يحتوي على علامات إحصائية، كل علامة تعبر عن تكرار للمجموعة التي ينتمي إليها نوع التمر الذي تنتجه المزرعة، وكل خمس علامات تكون حزمة إحصائية، كما هو مبين بالجدول التالي:

جدول تفرغ البيانات

نوع التمر	العلامات الإحصائية	عدد المزارع (التكرارات)
سكري		5
خلاص		10
برحي		13
صقعي		8
نبوت سيف		4
Sum		40

• تكوين الجدول التكراري.

وهو نفس الجدول السابق، باستثناء العود الثاني، ويأخذ الصورة التالية:

جدول رقم (1-2)

التوزيع التكراري لعينة حجمها 40 مزرعة حسب نوع التمر الذي تنتجه

نوع التمر	عدد المزارع (التكرارات) (f)	التوزيع التكراري النسبي
سكري	5	$\left(\frac{5}{40}\right) = 0.125$
خلاص	10	$\left(\frac{10}{40}\right) = 0.25$
برحي	13	$\left(\frac{13}{40}\right) = 0.325$

صقعي	8	$\left(\frac{8}{40}\right) = 0.20$
نبوت سيف	4	$\left(\frac{4}{40}\right) = 0.10$
Sum	40	1.00

المصدر: بيانات افتراضية.

3 -التوزيع التكراري النسبي:

يحسب التكرار النسبي بقسمة تكرار المجموعة على مجموع التكرارات، أي أن:

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار المجموعة}}{\text{مجموع التكرارات (n)}} = \left(\frac{f}{\sum f} \right) \quad (1-2)$$

والعمود الثالث في الجدول رقم (1-2) يعرض التكرار النسبي للمزارعين حسب نوع التمر.
4 -التعليق: من الجدول رقم (1-2) يلاحظ أن نسبة المزارع التي تنتج النوع "برحي" في العينة هي 32.5% وهي أكبر نسبة مما يدل على أن النمط الشائع في إنتاج التمور هو ذلك النوع، بينما نجد أن نسبة المزارع التي تنتج النوع "نبوت سيف" حوالي 10.0% وهي أقل نسبة.

مثال (2-2)

فيما يلي بيانات عن المستوى التعليمي لعينة من 50 فرد.

متوسط	يقراً ويكتب	ثانوي	متوسط	ثانوي	أعلى من جامعي	متوسط	ابتدائي
يقراً ويكتب	متوسط	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ابتدائي	متوسط
ابتدائي	ثانوي	يقراً ويكتب	جامعي	ثانوي	ابتدائي	يقراً ويكتب	ثانوي
متوسط	ابتدائي	متوسط	ثانوي	ثانوي	متوسط	ثانوي	متوسط
ثانوي	متوسط	ابتدائي	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ثانوي
جامعي	ثانوي	جامعي	ثانوي	ثانوي	أعلى من جامعي	ثانوي	ثانوي
متوسط	يقراً ويكتب						

والمطلوب: 1- اعرض البيانات في شكل جدول تكراري.

2 -كون التوزيع التكراري النسبي، ثم علق على النتائج.

الحل

1 -عرض البيانات في شكل جدول تكراري:

المستوى التعليمي (يقراً ويكتب- ابتدائي_ متوسط- ثانوي- جامعي- أعلى من جامعي)

متغير وصفي ترتيبي، ويمكن عرض البيانات أعلاه في شكل جدول تكراري بإتباع الآتي:

• تكوين جدول تفرغ البيانات:

جدول تفرغ البيانات

عدد الأفراد (التكرارات)	العلامات الإحصائية	المستوى التعليمي
6		يقراً ويكتب
10		ابتدائي

متوسط		12
ثانوي		15
جامعي		5
أعلى من جامعي		2
Sum		50

• تكوين الجدول التكراري:

جدول رقم (2-2)

التوزيع التكراري لعينة حجمها 50 فرد حسب المستوى التعليمي

المستوى التعليمي	عدد الأفراد (التكرارات) (f)	التوزيع التكراري النسبي
يقرأ ويكتب	6	0.12
ابتدائي	10	0.20
متوسط	12	0.24
ثانوي	15	0.30
جامعي	5	0.10
أعلى من جامعي	2	0.04
Sum	50	1.00

المصدر: بيانات عينة

2 - تكوين التوزيع التكراري النسبي.

بتطبيق المعادلة رقم (2-1) يمكن حساب التكرارات النسبية، والعمود الثالث في الجدول

رقم (2-2) بين هذا التوزيع،

ومن التوزيع النسبي يلاحظ أن حوالي 30% من أفراد العينة ممن لديهم مؤهل ثانوي، بينما

يكون نسبة الأفراد ممن لديهم مؤهل اقل من الثانوي (متوسط، ابتدائي، يقرأ ويكتب) أكثر من 5%،

أما نسبة الأفراد الحاصلين على مؤهل أعلى من جامعي حوالي 4% وهي أقل نسبة.

ملاحظات على الجدول

عند تكوين جدول ما لعرض البيانات، يجب مراعاة الآتي:

1 - كتابة رقم للجدول.

2 - كتابة عنوان للجدول.

3 - لكل عمود من أعمدة الجدول عنوان يدل على محتواه.

4 - يجب كتابة مصدر البيانات في الجدول.

2/2/2 عرض بيانات المتغير الكمي في شكل جدول تكراري بسيط

بنفس الأسلوب السابق المتبع في تكوين جدول تكراري، يمكن أيضا عرض بيانات المتغير

الكمي في شكل جدول تكراري بسيط، ويتكون هذا الجدول من عمودين، الأول يحتوي على فئات

تصاعدية للقراءات التي يأخذها المتغير، والثاني يشمل التكرارات أو عدد المفردات التي تنتمي

قراءتها للفئة المناسبة لها، والمثال التالي يبين كيف يمكن عرض البيانات الكمية ببيانيا.

مثال (2-3)

فيما يلي بيانات درجات 70 طالب في الاختبار النهائي لمقرر مادة الإحصاء التطبيقي.

56	65	70	65	55	60	66	70	75	56
60	70	61	67	61	71	67	62	71	66
68	72	57	68	72	69	57	71	69	75
72	62	67	73	58	63	66	73	63	65
58	73	74	76	74	80	81	60	74	58
76	82	77	83	77	85	91	78	94	72
79	64	57	79	55	87	64	88	78	62

والمطلوب:

- 1 -كون التوزيع التكراري لدرجات الطلاب.
- 2 -كون التوزيع التكراري النسبي.
- 3 -ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة ما بين 70 إلى أقل من 80؟
- 4 -ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة أقل من 70 درجة؟
- 5 -ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 80 أو أكثر؟

الحل

1 -تكوين التوزيع التكراري:

درجة الطالب في الاختبار متغير كمي مستمر، ولكي يتم تبويب البيانات في شكل جدول

تكراري، يتم اتباع الآتي:

- حساب المدى Range(R)

$$\text{Range} = \text{Maximum} - \text{Minimum}$$

$$R = 94 - 55 = 39$$

- تحديد عدد الفئات Classes(C):

تحدد عدد الفئات وفقا لاعتبارات منها: رأي الباحث، والهدف من البحث، وحجم البيانات،

ويرى كثيرا من الباحثين أن أفضل عدد للفئات يجب أن يتراوح بين 5 إلى 15 ، بفرض أن

عدد الفئات هو 8 فئات، أي أن: (C=8).

- حساب طول الفئة Length(L):

$$L = \frac{\text{Range}}{\text{Classes}} = \frac{R}{C} = \frac{39}{8} = 4.875 \approx 5$$

- تحديد الفئات:

الفئة تبدأ بقيمة تسمى الحد الأدنى، وتنتهي بقيمة تسمى الحد الأعلى، ومن ثم نجد أن :

- الحد الأدنى للفئة الأولى هو أقل قراءة (درجة) أي أن الحد الأدنى للفئة الأولى = 55

الحد الأعلى للفئة الأولى = الحد الأدنى + طول الفئة = 55 + L = 60=55+5

- إذا الفئة الأولى هي: "55 to les than 60" وتقرأ "من 55 إلى أقل من 60"
- الحد الأدنى للفئة الثانية = الحد الأعلى للفئة الأولى = 60
- الحد الأعلى للفئة الثانية = الحد الأدنى للفئة + طول الفئة = 65 = 60 + 5
- إذا الفئة الثانية هي: "60 to les than 65" وتقرأ "من 60 إلى أقل من 65"
- وينفس الطريقة يتم تكوين حدود الفئات الأخرى، وهي:
- الفئة الثالثة: 65 to les than 70 الفئة الرابعة: 70 to les than 75
- الفئة الخامسة: 75 to les than 80 الفئة السادسة: 80 to les than 85
- الفئة السابعة: 85 to les than 90 الفئة الثامنة: 90 to les than 95
- ويمكن كتابة الفئات بأشكال مختلفة كما هو مبين بجدول تفرغ البيانات:
- تكوين جدول تفرغ البيانات:

جدول تفرغ البيانات

الدرجة			العلامات	عدد الطلاب
فئات	فئات	فئات	الإحصائية	(التكرارات)
55 to les than 60	55 – 60	55-		10
60 to les than 65	60 – 65	60-		12
65 to les than 70	65 – 70	65-		13
70 to les than 75	70 – 75	70-		16
75 to les than 80	75 – 80	75-		10
80 to les than 85	80 – 85	80-		4
85 to les than 90	85 – 90	85-		3
90 to les than 95	90 - 95	90-95		2
Sum				70

- تكوين الجدول التكراري:

جدول رقم (2-3)

التوزيع التكراري لعدد 70 طالب حسب درجاتهم في اختبار مقرر الإحصاء

فئات الدرجة	عدد الطلاب (التكرارات) (f)	التكرار النسبي
55 – 60	10	0.143
60 – 65	12	0.171
65 – 70	13	0.186
70 – 75	16	0.229
75 – 80	10	0.143
80 – 85	4	0.057
85 – 90	3	0.043
90 – 95	2	0.028
Sum	70	1.00

المصدر: بيانات نتيجة العام 1426هـ.

2 - التوزيع التكراري النسبي:

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{f}{n}$$

والعمود الثالث في الجدول رقم (2-3) يبين التكرار النسبي.

3 - نسبة الطلاب الحاصلين على درجات ما بين 70 إلى أقل من 80 هو مجموع التكرارين النسبيين للفئتين الرابعة والخامسة:

$$0.229 + 0.143 = 0.372 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجات ما بين (70 , 80)}$$

أي حوالي 37.2% من الطلاب حصلوا على درجات ما بين (70 , 80) .

4 - نسبة الطلاب الحاصلين على درجات أقل من 70، هو مجموع التكرارات النسبية للفئات الأولى والثانية، والثالثة:

$$0.143 + 0.171 + 0.186 = 0.5 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجة أقل من 70}$$

أي أن حوالي 50% من الطلاب حصلوا على درجة أقل من 70 درجة

5 - نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 80 أو أكثر، هو مجموع التكرارات النسبية للفئات الثلاث الأخيرة:

$$0.057 + 0.043 + 0.028 = 0.128 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجات 80 أو أكثر}$$

أي أن حوالي 12.8% من الطلاب حصلوا على درجة 80 أو أكثر.

3/2 العرض البياني للبيانات الكمية

العرض البياني للبيانات، هو أحد طرق التي يمكن استخدامها في وصف البيانات، من حيث شكل التوزيع ومدى تمركز البيانات، وفي كثير من النواحي التطبيقية يكون العرض البياني أسهل وأسرع في وصف الظاهرة محل الدراسة، وتختلف طرق عرض البيانات بيانيا حسب نوع البيانات المبوبة في شكل جدول تكراري، وفيما يلي عرض للأشكال البيانية المختلفة.

1/3/2 المدرج التكراري Histogram

المدرج التكراري هو التمثيل البياني للجدول التكراري البسيط الخاص بالبيانات الكمية المتصلة، وهو عبارة عن أعمدة بيانية متلاصقة، حيث تمثل التكرارات على المحور الرأسي، بينما تمثل قيم المتغير (حدود الفئات) على المحور الأفقي، ويتم تمثيل كل فئة بعمود، ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة.

مثال (2-4)

فيما يلي التوزيع التكراري لأوزان عينة من الدواجن بالجرام، حجمها 100 اختيرت من أحد

المزارع بعد 45 يوم.

الوزن	600-	620-	640-	660-	680-	700-720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100

والمطلوب:

- 1 - ما هو طول الفئة؟
- 2 - ارسم المدرج التكراري.
- 3 - ارسم المدرج التكراري النسبي، ثم علق على الرسم.

الحل

1 - طول الفئة (L)

$$\text{طول الفئة} = \text{الحد الأعلى للفئة} - \text{الحد الأدنى للفئة}$$
$$L = \text{upper} - \text{Lower}$$

(٢-٢)

$$L = 620 - 600 = 640 - 620 = \dots = 720 - 700 = 20$$

إذا طول الفئة = 20


2 - رسم المدرج التكراري.

لرسم المدرج التكراري يتم إتباع الخطوات التالية:

- رسم محوران متعامدان، الرأسى ويمثل التكرارات، الأفقى ويمثل الأوزان.
 - كل فئة تمثل بعمود ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة.
 - كل عمود يبدأ من حيث انتهى به عمود الفئة السابقة.
- والشكل (1-2) يبين المدرج التكراري لأوزان الدجاج.

شكل (1-2)

المدرج التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة



3 رسم المدرج التكراري النسبي: لرسم المدرج التكراري النسبي يتم إجراء الآتي:


- حساب التكرارات النسبية.

الوزن	600-	620-	640-	660-	680-	700-720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100
التكرار النسبي	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.10	1.00

- يتابع نفس الخطوات السابقة عند رسم المدرج التكراري، يتم رسم المدرج التكراري النسبي، بإحلال التكرارات النسبية محل التكرارات المطلقة على المحور الرأسي، كما هو مبين في الشكل التالي:

شكل (2-2)

المدرج التكراري النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة



ومن الشكل أعلاه يلاحظ الآتي:

- أن 25% من الدجاج يتراوح وزنه بين 660 ، 680 جرام وهي أكبر نسبة.
- أن الشكل ملتوي جهة اليسار، مما يدل على أن توزيع أوزان الدجاج سالب الالتواء.

ملاحظات على شكل المدرج التكراري

- أ - أن المساحة أسفل المدرج التكراري تساوي مجموع التكرارات (n).
- ب - أما المساحة أسفل المدرج التكراري النسبي، فهي تعبر عن مجموع التكرارات النسبية، وهي تساوي الواحد الصحيح.
- ت - يمكن تقدير القيم الشائعة، وهي القيم التي يناظرها أكبر ارتفاع، ففي الشكلين السابقين، نجد أن الوزن الشائع يقع في الفئة (660-680) ويطلق عليه المنوال.
- ث - يمكن معرفة شكل توزيع البيانات، كما هو مبين بالأشكال الثلاثة التالية:

شكل (2-3)



2/3/2 المضلع التكراري

هو تمثيل بياني أيضا للجدول التكراري البسيط، حيث تمثل التكرارات على المحور الرأسي، ومراكز الفئات على المحور الأفقي، ثم التوصيل بين الإحداثيات بخطوط منكسرة، وبعد ذلك يتم توصيل طرفي المضلع بالمحور الأفقي. ومركز الفئة هي القيمة التي تقع في منتصف الفئة، وتحسب بتطبيق المعادلة التالية:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة} + \text{الحد الأعلى للفئة}}{2} \quad (3-2)$$

$$\text{Midpoint} = \frac{\text{Lower} + \text{Upper}}{2}$$

ونظرا لعدم معرفة القيم الفعلية لتكرار كل فئة، يعتبر مركز الفئة هو التقدير المناسب لقيمة كل مفردة من مفردات الفئة.

مثال (2-5)

استخدم بيانات الجدول التكراري في المثال (2-4) لرسم المضلع التكراري.

الحل

رسم المضلع التكراري يتبع الآتي:

- حساب مراكز الفئات بتطبيق المعادلة رقم (2-3)

الوزن	عدد الدجاج (التكرار)	مركز الفئة (x)
600-	10	$(600+620)/2= 610$
620-	15	$(620+640)/2=630$
640-	20	650
660-	25	670
680-	20	690
700-720	10	$(700+720)/710$
Sum	100	


- نقط الإحداثيات هي :

مركز الفئة (x)	590	610	630	650	670	690	710	730
التكرار (y)	0	10	15	20	25	20	10	0

- التمثيل البياني لنقط الإحداثيات وتوصيلها بخطوط مستقيمة، كما هو مبين بالشكل (4-2)

شكل (4-2)

المضلع التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة




3/3/2 المنحنى التكراري

يأتبع نفس الخطوات السابقة في رسم المضلع يمكن رسم المنحنى التكراري، ولكن يتم تمهيد الخطوط المنكسرة في شكل منحنى بحيث يمر بأكثر عدد من النقاط، وفي المثال السابق يمكن رسم المنحنى التكراري، والشكل (5-2) يبين هذا الشكل.

شكل (5-2)


المنحنى التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة




كما يمكن رسم المنحنى التكراري النسبي بتمثيل التكرارات النسبية على المحور الرأسي بدلا من التكرارات المطلقة، ومن ثم يأخذ هذا المنحنى الشكل رقم (2-6) التالي:

شكل (2-6)

المنحنى التكراري النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة



والمنحنى التكراري أعلاه موجب الالتواء، كما أن المساحة أسفل هذا المنحنى تعبر عن مجموع التكرارات النسبية، أي أنها تساوي الواحد الصحيح، وهناك أشكال مختلفة للمنحنى التكراري النسبي، تدل على أشكال توزيع البيانات، ومن أهمها ما يلي:



3/3 التوزيعات التكرارية المتجمعة

في كثير من الأحيان قد يحتاج الباحث إلى معرفة عدد المشاهدات التي تقل عن قيمة معينة أو تزيد عن قيمة معينة، ومن ثم يلجأ الباحث إلى تكوين جداول تجميعية صاعدة أو هابطة، وفيما يلي بيان كيفية تكوين كل نوع من هذين النوعين على حدة:

1/3/3 التوزيع التكراري المتجمع الصاعد

لتكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد، يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تقل عن كل حد من حدود الفئات.

مثال (2-6)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع 40 بقرة في مزرعة حسب كمية الألبان التي تنتجها البقرة في اليوم باللتر.

كمية الألبان	18-	22-	26-	30-	34-38	Sum
عدد الأبقار	4	9	15	8	4	40

والمطلوب:

- 1- كون جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.
- 2- كون جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي.
- 3- رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد النسبي.
- 4- من المنحنى المتجمع أوجد الآتي:
 - نسبة الأبقار التي يقل إنتاجها عن 28 لتر.
 - كمية الإنتاج التي يقل عنها 25% من الأبقار.
 - كمية الإنتاج التي يقل عنها 50% من الإنتاج.

الحل

1- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.

التوزيع التكراري

توزيع تكراري متجمع صاعد

كمية الإنتاج باللتر	عدد الأبقار	أقل من	تكرار متجمع صاعد	تكرار متجمع صاعد نسبي
22-	9	18-	4	0.10
26-	15	22-	13	0.325
30-	8	26-	28	0.70
34-38	4	30-	36	0.90
Sum	40	34-38	40	1.00


2- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي: يحسب التكرار المتجمع الصاعد النسبي بقسمة

التكرار المتجمع الصاعد على مجموع التكرارات، كما هو مبين بالعمود الأخير في جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.


3 - رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد: المنحنى التكراري المتجمع الصاعد النسبي هو التمثيل البياني للتوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي، حيث تمثل حدود الفئات على المحور الأفقي، والتكرار المتجمع الصاعد النسبي على المحور الرأسي، ويتم تمهيد المنحنى ليمر بالإحداثيات، كما هو مبين في الشكل التالي:



• نسبة الأبقار التي يقل إنتاجها عن 28 لتر هي 0.47 تقريبا.



• كمية الإنتاج التي يقل عنها 25% من قيم الإنتاج هي: 25 لتر تقريبا.



- كمية الإنتاج التي يقل عنها 50% من قيم الإنتاج هي: 28.5 لتر، ويطلق عليها الوسيط:



2/3/3 التوزيع التكراري المتجمع الهابط (النازل)

لتكوين الجدول التكراري المتجمع النازل، يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تساوي أو تزيد عن كل حد من حدود الفئات.

مثال (2-7)

استخدم بيانات الجدول التكراري في مثال (2-6)، وأوجد الآتي:

- 1- كون التوزيع التكراري المتجمع النازل.
- 2- ارسم المنحنى التكراري المتجمع النازل النسبي.

الحل:

1- تكوين التوزيع التكراري المتجمع النازل.

التوزيع التكراري


توزيع تكراري متجمع نازل

تكرار متجمع	تكرار	أكثر من أو يساوي	عدد الأبقار	كمية الإنتاج
-------------	-------	------------------	-------------	--------------

باللتر	
18-	4
22-	9
26-	15
30-	8
34-38	4

	متجمع نازل	نازل نسبي
18-	40	1.00
22-	36	0.90
26-	27	0.675
30-	12	0.30
34-38	4	0.10

رسم المنحنى التكراري المتجمع النازل.



ملاحظات:

- 1 يمكن رسم المنحنيين في شكل بياني واحد، ويلاحظ أنهما يتقاطعان عند نقطة تسمى الوسيط.
- 2 يكون استخدامنا للمنحنى المتجمع الصاعد أكثر وأوقع من الناحية التطبيقية.

4/3 العرض البياني للبيانات الوصفية

يمكن عرض البيانات الخاصة بمتغير وصفي في شكل دائرة بيانية أو أعمدة بيانية، يمكن من خلاله وصف ومقارنة مجموعات أو مستويات هذا المتغير.

1/4/3 الدائرة البيانية

لعرض بيانات المتغير الوصفي في شكل دائرة، يتم توزيع الـ 360° درجة حسب التكرار النسبي لمجموعات المتغير، حيث تحدد مقدار الزاوية الخاصة بالمجموعة رقم r بتطبيق المعادلة التالية:

$$\text{التكرار النسبي للمجموعة} \times 360^\circ = \text{مقدار الزاوية}$$

مثال (2-8)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع عينة حجمها 500 أسرة حسب المنطقة التي تنتمي إليها.

sum	العربية	القصيم	الشرقية	الرياض	المنطقة
-----	---------	--------	---------	--------	---------

عدد الأسر	150	130	50	170	500
-----------	-----	-----	----	-----	-----

مثل البيانات أعلاه في شكل دائرة بيانية.

الحل:

1- تحديد مقدار الزاوية المخصصة لكل منطقة، بتطبيق المعادلة:

$$\text{التكرار النسبي للمنطقة} \times 360^\circ = \text{مقدار الزاوية المخصص للمنطقة}$$


المنطقة	عدد الأسر	التكرار النسبي	مقدار الزاوية
الرياض	150	0.30	$360 \times 0.30 = 108^\circ$
الشرقية	130	0.26	$360 \times 0.26 = 93.6^\circ$
القصيم	50	0.10	$360 \times 0.10 = 36^\circ$
الغربية	170	0.34	$360 \times 0.34 = 122.4^\circ$
Sum	500	1.00	360°

2- رسم الدائرة

يتم رسم دائرة وتقسيمها إلى أربع أجزاء لكل منطقة جزء يتناسب مع مقدار الزاوية المخصصة له، كما هو مبين في الشكل التالي:

شكل رقم (2-7)

الدائرة البيانية لعينة حجمها 500 أسرة موزعة حسب المنطقة



ومن الشكل أعلاه يلاحظ أن نسبة الأسر التي تنتمي للمنطقة الغربية حوالي 34% وهي أكبر نسبة في العينة، بينما يكون نسبة الأسر في منطقة القصيم حوالي 10% وهي أقل نسبة في العينة.

الفصل الثالث

مقاييس النزعة المركزية

Central Tendency

1/3 مقدمة

في كثير من النواحي التطبيقية يكون الباحث في حاجة إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم ، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا . والاعتماد على العرض البياني وحدة لا يكفي ، ولذا يتناول هذا الفصل، والذي يليه عرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر ، ومن أهم هذه المقاييس ، مقاييس النزعة المركزية والتشتت .

2/3 مقاييس النزعة المركزية

تسمى مقاييس النزعة المركزية بمقاييس الموضع أو المتوسطات ، وهي القيم التي تتركز القيم حولها ، ومن هذه المقاييس ، الوسط الحسابي ، والنموال ، والوسيط ، والوسط الهندسي ، والوسط التوافقي ، والرابعيات ، والمئينات ، وفيما يلي عرض لأهم هذه المقاييس

1/2/3 الوسط الحسابي Arithmetic Mean

من أهم مقاييس النزعة المركزية ، وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقية ، ويمكن حسابه للبيانات المبوبة وغير المبوبة ، كما يلي :

أولاً: الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة

يعرف الوسط الحسابي بشكل عام على أنه مجموع القيم مقسوما على عددها . فإذا كان لدينا n من القيم ، ويرمز لها بالرمز : x_1, x_2, \dots, x_n .

فإن الوسط الحسابي لهذه القيم ، ونرمز له بالرمز \bar{x} يحسب بالمعادلة التالية :

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} \quad (1-3)$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

حيث يدل الرمز Σ على المجموع .

مثال (1-3)

فيما يلي درجات 8 طلاب في مقرر 122 إحصاء تطبيقي .

34 32 42 37 35 40 36 40

والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لدرجة الطالب في الامتحان .

الحل

لإيجاد الوسط الحسابي للدرجات تطبق المعادلة رقم (1-3) كما يلي:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$= \frac{34 + 32 + 42 + 37 + 35 + 40 + 36 + 40}{8} = \frac{296}{8} = 37$$

أي أن الوسط الحسابي لدرجة الطالب في اختبار مقرر 122 إحصاء يساوي 37 درجة

ثانياً: الوسط الحسابي للبيانات المبوبة

من المعلوم أن القيم الأصلية ، لا يمكن معرفتها من جدول التوزيع التكراري ، حيث أن هذه القيم موضوعة في شكل فئات ، ولذا يتم التعبير عن كل قيمة من القيم التي تقع داخل حدود الفئة بمركز هذه الفئة ، ومن ثم يؤخذ في الاعتبار أن مركز الفئة هو القيمة التقديرية لكل مفردة تقع في هذه الفئة.

فإذا كانت k هي عدد الفئات ، وكانت x_1, x_2, \dots, x_k هي مراكز هذه الفئات ، f_1, f_2, \dots, f_k هي التكرارات ، فإن الوسط الحسابي يحسب بالمعادلة التالية:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} \quad (2-3)$$

مثال (2-3)

الجدول التالي يعرض توزيع 40 تلميذ حسب أوزانهم .

فئات الوزن	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44
عدد التلاميذ	4	7	13	10	5	1

والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي.

الحل

لحساب الوسط الحسابي باستخدام المعادلة رقم (2-3) يتم إتباع الخطوات التالية :

- 1 - إيجاد مجموع التكرارات $\sum f$.
- 2 - حساب مراكز الفئات x .
- 3 - ضرب مركز الفئة في التكرار المناظر له (x, f) ، وحساب المجموع $\sum xf$
- 4 - حساب الوسط الحسابي بتطبيق المعادلة رقم (2-3) .

فئات الوزن (C)	التكرارات f	مراكز الفئات x	$x f$
32-34	4	$(32+34) \div 2=33$	$4 \times 33=132$
34-36	7	35	$7 \times 35=245$
36-38	13	37	$13 \times 37=481$
38-40	10	39	$10 \times 39=390$
40-42	5	41	$5 \times 41=205$
42-44	1	43	$1 \times 43=43$
المجموع	40		1496

إذا الوسط الحسابي لوزن التلميذ هو :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i f_i}{\sum_{i=1}^6 f_i} = \frac{1496}{40} = 37.4 \text{ k.g}$$

أي أن متوسط وزن التلميذ يساوي 37.4 k.g

خصائص الوسط الحسابي

يتصف الوسط الحسابي بعدد من الخصائص ، ومن هذه الخصائص ما يلي :

- 1 -الوسط الحسابي للمقدار الثابت يساوى الثابت نفسه ، أي أنه إذا كانت قيم x هي :

$$x : a, a, \dots, a$$

$$\bar{x} = \frac{a + a + \dots + a}{n} = \frac{na}{n} = a \quad (3-3)$$

ومثال على ذلك ، لو اخترنا مجموعة من 5 طلاب ، ووجدنا أن كل طالب وزنه 63 كيلوجرام ، فإن

متوسط وزن الطالب في هذه المجموعة هو :

$$\bar{x} = \frac{63 + 63 + 63 + 63 + 63}{5} = \frac{315}{5} = 63 \text{ k.g}$$

2 - مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوى صفرا ، ويعبر عن هذه الخاصية بالمعادلة .

$$\boxed{\sum (x - \bar{x}) = 0} \quad (4-3)$$

ويمكن التحقق من هذه الخاصية باستخدام بيانات مثال (3-1) ، نجد أن درجات الطلاب هي : 34, 32, 42, 37, 35, 40, 36, 40, 296 ، والوسط الحسابي للدرجة هو $\bar{x} = 37$ ، إذا :

x	34	32	42	37	35	40	36	40	296
$(x - \bar{x})$	34-37	32-37	42-37	37-37	35-37	40-37	36-37	40-37	0
$(x - 37)$	-3	-5	5	0	-2	3	-1	3	

$$\sum (x - 37) = 0 \quad \text{أي أن :}$$

3 - إذا أضيف مقدار ثابت إلى كل قيمة من القيم ، فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (بعد الإضافة) يساوى الوسط الحسابي للقيم الأصلية (قبل الإضافة) مضافا إليها هذا المقدار الثابت . فإذا كانت القيم هي : x_1, x_2, \dots, x_n ، وتم إضافة مقدار ثابت (a) إلى كل قيمة من القيم ، ونرمز للقيم الجديدة بالرمز y ، أي أن $y = x + a$ ، فإن : الوسط الحسابي لقيم y (القيم بعد الإضافة) هو :

$$\boxed{\bar{y} = \bar{x} + a} \quad (5-3)$$

حيث أن \bar{y} هو الوسط الحسابي للقيم الجديدة ، ويمكن التحقق من هذه الخاصية باستخدام بيانات مثال رقم (3-1) .

إذا قرر المصحح إضافة 5 درجات لكل طالب ، فإن الوسط الحسابي للدرجات المعدلة يصبح قيمته $\{(37+5)=42\}$ ، والجدول التالي يبين ذلك .

x	34	32	42	37	35	40	36	40	296
$y = (x + 5)$	34+5	32+5	42+5	37+5	35+5	40+5	36+5	40+5	336
	39	37	47	42	40	45	41	45	

نجد أن مجموع القيم الجديدة هو : $\sum y = 336$ ، ومن ثم يكون الوسط الحسابي للقيم الجديدة هو :

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{336}{8} = 42 \rightarrow (\bar{x} + 5 = 37 + 5 = 42)$$

4 - إذا ضرب مقدار ثابت (a) في كل قيمة من القيم ، فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (القيم الناتجة بعد الضرب) يساوى الوسط الحسابي للقيم الأصلية (القيم بعد التعديل) مضروباً في هذا المقدار الثابت . أى أنه إذا كان : $y = a x$ ، ويكون الوسط الحسابي للقيم الجديدة \bar{y} هو :

$$\boxed{\bar{y} = a \bar{x}} \quad (٦-٣)$$

ويمكن للطالب أن يتحقق من هذه الخاصية باستخدام نفس بيانات المثال السابق . فإذا كان تصحيح الدرجة من 50 ، وقرر المصحح أن يجعل التصحيح من 100 درجة ، بمعنى أنه سوف يضرب كل درجة في قيمة ثابتة (a=2) ، ويصبح الوسط الحسابي الجديد هو : $\bar{y} = a \bar{x} = 2(37) = 74$

5 - مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي أقل ما يمكن ، أي أن :

$$\boxed{\sum (x - \bar{x})^2 < \sum (x - a)^2 \text{ if } a \neq \bar{x}} \quad (٧-٣)$$

وفي المثال السابق فإن : $\sum (x - 37)^2 < \sum (x - a)^2$ لجميع قيم $a \neq 37$

ثالثاً: الوسط الحسابي المرجح

في بعض الأحيان يكون لكل قيمة من قيم المتغير أهمية نسبية تسمى أوزن ، أو ترجيحات ، وعدم أخذ هذه الأوزان في الاعتبار عند حساب الوسط الحسابي ، تكون القيمة المعبرة عن الوسط الحسابي غير دقيقة ، فمثلاً لو أخذنا خمسة طلاب ، وسجلنا درجات هؤلاء الطلاب في مقرر الإحصاء التطبيقي ، وعدد ساعات الاستذكار في الأسبوع .

مسلسل	1	2	3	4	5	sum
x (الدرجة)	23	40	36	28	46	173
W (عدد ساعات الاستذكار)	1	3	3	2	4	

نجد أن الوسط الحسابي غير المرجح للدرجة الحاصل عليها الطالب هي :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{23 + 40 + 36 + 28 + 46}{5} = \frac{173}{5} = 34.6$$

وإذا أردنا أن نحسب الوسط الحسابي للدرجات x المرجحة بعدد ساعات الاستذكار W ، يتم تطبيق

المعادلة التالية :

$$\begin{aligned}(\bar{w}) &= \frac{\sum xw}{\sum w} = \frac{23 \times 1 + 40 \times 3 + 36 \times 3 + 28 \times 2 + 46 \times 4}{1 + 3 + 3 + 2 + 4} \\ &= \frac{23 + 120 + 108 + 56 + 184}{13} = \frac{491}{13} = 37.769\end{aligned}$$

وهذا الوسط المرجح أكثر دقة من الوسط الحسابي غير المرجح .
إذا الوسط الحسابي المرجح (\bar{w}) يحسب بتطبيق المعادلة التالية :

$$\boxed{(\bar{w}) = \frac{\sum xw}{\sum w}} \quad (٨-٣)$$

مزايا وعيوب الوسط الحسابي

يتميز الوسط الحسابي بالمزايا التالية :

- أنه سهل الحساب .
- يأخذ في الاعتبار كل القيم .
- أنه أكثر المقاييس استخداما وفهما .
- ومن عيوبه .
- أنه يتأثر بالقيم الشاذة والمتطرفة .
- يصعب حسابه في حالة البيانات الوصفية .
- يصعب حسابه في حالة الجداول التكرارية المفتوحة .

2/2/3 الوسيط Median

هو أحد مقاييس النزعة المركزية، والذي يأخذ في الاعتبار رتب القيم ، ويعرف الوسيط بأنه القيمة التي يقل عنها نصف عدد القيم $(n/2)$ ، ويزيد عنها النصف الآخر $(n/2)$ ، أي أن 50% من القيم أقل منه، 50% من القيم أعلى منه. وفيما يلي كيفية حساب الوسيط في حالة البيانات غير مبوبة ، والبيانات المبوبة.

أولاً: الوسيط للبيانات غير المبوبة

ليان كيف يمكن حساب الوسيط للبيانات غير المبوبة ، نتبع الخطوات التالية:

- ترتب القيم تصاعديا .
- تحديد رتبة الوسيط، وهي : $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ رتبة الوسيط =
- إذا كان عدد القيم (n) فردي فإن الوسيط هو:

$$\boxed{\left(\frac{n+1}{2}\right) \text{ الوسيط} = \text{القيمة رقم}} \quad (9-3)$$

- إذا كان عدد القيم (n) زوجي، فإن الوسيط يقع بين القيمة رقم ($n/2$)، والقيمة رقم $((n/2)+1)$ ، ومن ثم يحسب الوسيط بتطبيق المعادلة التالي:

$$\boxed{\frac{\left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ القيمة رقم} + \left(\frac{n}{2}\right) \text{ القيمة رقم}}{2} = \text{الوسيط}} \quad (10-3)$$

مثال (3-3)

تم تقسيم قطعة أرض زراعية إلى 17 وحدة تجريبية متشابهة ، وتم زراعتها بمحصول القمح ، وتم استخدام نوعين من التسميد هما : النوع (a) وجرب على 7 وحدات تجريبية ، والنوع (b) وجرب على 10 وحدات تجريبية ، وبعد انتهاء الموسم الزراعي ، تم تسجيل إنتاجية الوحدة بالطن / هكتار ، وكانت على النحو التالي :

النوع (a)	1.2	2.75	3.25	2	3	2.3	1.5			
النوع (b)	4.5	1.8	3.5	3.75	2	2.5	1.5	4	2.5	3

والمطلوب حساب وسيط الإنتاج لكل نوع من السماد المستخدم، ثم قارن بينها.

الحل

أولا : حساب وسيط الإنتاج للنوع الأول (a)

- ترتيب القيم تصاعديا :

	قيمة الوسيط						
الإنتاج	1.2	1.5	2	2.3	2.75	3	3.25
الرتبة	1	2	2	4	5	6	7
	رتبة الوسيط						

- عدد القيم فردى ($n = 7$)
- إذا رتبة الوسيط هي: $((n+1)/2 = (7+1)/2 = 4)$.
- ويكون الوسيط هو القيمة رقم 4 ، أي أن وسيط الإنتاج للنوع a هو:

$$Med_a = 2.3 \text{ طن / هكتار}$$

ثانيا : حساب وسيط الإنتاج للنوع الثاني (b) :

- ترتيب القيم تصاعديا .

$$\frac{2.5 + 3}{2} = \text{قيمة الوسيط}$$

الإنتاج	1.5	1.8	2	2.5	2.5	3	3.5	3.75	4	4.5
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

رتبة الوسيط

- عدد القيم زوجي ($n = 10$) إذا
- رتبة الوسيط هي : $((n+1)/2 = (10+1)/2 = 5.5)$
- الوسيط = الوسط الحسابي للقيمتين الواقعتين في المنتصف (رقم 5 ، 6) .

$$Med_b = \frac{2.5 + 3}{2} = 2.75 \text{ طن / هكتار}$$

وبمقارنة النوعين من السماد ، نجد أن وسيط إنتاجية النوع (a) أقل من وسيط إنتاجية النوع

$$(b) ، أي أن : $Med_b > Med_a$.$$


ثانياً: الوسيط للبيانات المبوبة

لحساب الوسيط من بيانات مبوبة في جدول توزيع تكراري ، يتم إتباع الخطوات التالية .

- تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد .

$$\left(\frac{n}{2}\right) = \left(\frac{\sum f}{2}\right) : \text{تحديد رتبة الوسيط}$$

- تحديد فئة الوسيط كما في الشكل التالي :



- ويحسب الوسيط ، بتطبيق المعادلة .

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L \quad (11-3)$$

حيث أن :

L هي طول فئة الوسيط، وتحسب بالمعادلة التالية:

طول الفئة = الحد الأعلى - الحد الأدنى

$$L = Upper - Lower$$

مثال (3-4)

فيما يلي توزيع 50 عجل متوسط الحجم ، حسب احتياجاته اليومية من الغذاء الجاف بالكيلوجرام

فئات الاحتياجات اليومية	1.5 -	4.5 -	7.5 -	10.5 -	13.5 - 16.5
عدد العجول f	4	12	19	10	5

والمطلوب : حساب الوسيط : أ - حسابيا ب - بيانيا

الحل

أولا : حساب الوسيط حسابيا

• رتبة الوسيط : $\frac{n}{2} = \frac{\sum f}{2} = \frac{50}{2} = 25$

• الجدول التكراري المتجمع الصاعد :

أقل من	تكرار متجمع صاعد
1.5	0
4.5	4
A 7.5	f_1 16
Med (الوسيط)	25
10.5	f_2 35
13.5	45
16.5	50

رتبة الوسيط

- تحديد فئة الوسيط : وهي الفئة التي تشمل قيمة الوسيط ، وهي قيمة أقل منها ($n/2$) من القيم ، ويمكن معرفتها بتحديد التكرارين المتجمعين الصاعدين الذين يقع بينهما رتبة الوسيط ($n/2$) ، وفي الجدول أعلاه نجد أن رتبة الوسيط (25) تقع بين التكرارين المتجمعين (35 ، 16) ، ويكون الحد الأدنى لفئة الوسيط هو المناظر للتكرار المتجمع الصاعد السابق (7.5 ، والحد الأعلى لفئة الوسيط هو المناظر للتكرار المتجمع الصاعد اللاحق 10.5 . أي أن فئة الوسيط هي : (7.5-10.5) .

- وبتطبيق معادلة الوسيط رقم (3-11) على هذا المثال نجد أن :


$$A=7.5 , f_1=16 , f_2=35 , L=10.5-7.5=3$$

إذا الوسيط قيمته هي :

$$\begin{aligned} Med &= A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L = 7.5 + \frac{25 - 16}{35 - 16} \times 3 \\ &= 7.5 + \frac{9}{19} \times 3 = 7.5 + \frac{27}{19} = 7.5 + 1.421 = 8.921 \text{ k.g} \end{aligned}$$

ثانيا : حساب الوسيط بيانيا

- تمثيل جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد بيانيا .



- تحديد رتبة الوسيط (25) على المنحنى التكراري المتجمع الصاعد . ثم رسم خط مستقيم أفقي حتى يلقى المنحنى في النقطة (a) .
- إسقاط عمود رأسي من النقطة (a) على المحور الأفقي .
- نقطة تقاطع الخط الرأسي مع المحور الأفقي تعطى قيمة الوسيط .
- الوسيط كما هو مبين في الشكل $Med = 8.6$.

مزايا وعيوب الوسيط

من مزايا الوسيط

- 1 - لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة .
- 2 - كما أنه سهل في الحساب .
- 3 - مجموع قيم الانحرافات المطلقة عن الوسيط أقل من مجموع الانحرافات المطلقة عن أي قيم أخرى . أي أن :

$$\sum |x - Med| \leq \sum |x - a| , a \neq Med$$

ومن عيوب الوسيط

- 1 - أنه لا يأخذ عند حسابه كل القيم في الاعتبار، فهو يعتمد على قيمة أو قيمتين فقط .
- 2 - يصعب حسابه في حالة البيانات الوصفية المقاسة بمعياري اسمي nominal

3/2/3 المنوال Mode

يعرف المنوال بأنه القيمة الأكثر شيوعاً أو تكراراً ، ويكثر استخدامه في حالة البيانات الوصفية ، لمعرفة النمط (المستوى) الشائع، ويمكن حسابه للبيانات المبوبة وغير المبوبة كما يلي:

أولاً: حساب المنوال في حالة البيانات غير المبوبة

$$\text{المنوال (Mod) = القيمة (المستوى) الأكثر تكراراً} \quad (12-3)$$

ثانياً: حساب المنوال في حالة البيانات المبوبة (طريقة الفروق)

$$\text{Mod} = A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L \quad (13-3)$$

حيث أن :

A : الحد الأدنى لفئة المنوال (الفئة المناظرة لأكثر تكرار) .

d_1 : الفرق الأول = (تكرار فئة المنوال - تكرار سابق)

d_2 : الفرق الثاني = (تكرار فئة المنوال - تكرار لاحق)

L : طول فئة المنوال .

فئة المنوال = الفئة المناظرة لأكثر تكرار

$$\begin{array}{l} \text{تكرار سابق} \\ \text{تكرار فئة المنوال} \\ \text{تكرار لاحق} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} d_1 = (\text{تكرار فئة المنوال} - \text{تكرار سابق}) \\ d_2 = (\text{تكرار فئة المنوال} - \text{تكرار لاحق}) \end{array} \right.$$

مثال (3-5)

اختيرت عينات عشوائية من طلاب بعض أقسام كلية علوم الأغذية والزراعة ، وتم رصد درجات

هؤلاء الطلاب في مقرر 122 إحصاء التطبيقي ، وكانت النتائج كالتالي :

قسم وقاية النباتات	80	77	75	77	77	77	65	70	58	67
قسم علوم الأغذية	88	68	60	75	93	65	77	85	95	90

قسم الاقتصاد	80	65	69	80	65	88	76	65	86	80
قسم الإنتاج الحيواني	85	73	69	85	73	69	69	73	72	85

والمطلوب حساب منوال الدرجات لكل قسم من الأقسام :

الحل

هذه البيانات غير مبوبة ، لذا فإن :

المنوال = القيمة الأكثر تكرارا

والجدول التالي يبين منوال الدرجة لكل قسم من الأقسام .

القسم	القيمة الأكثر تكرار	القيمة المنوالية
قسم وقاية النباتات	الدرجة 77 تكررت 4 مرات	المنوال = 77 درجة
قسم علوم الأغذية	جميع القيم ليس لها تكرار	لا يوجد منوال
قسم الاقتصاد	الدرجة 65 تكررت 3 مرات الدرجة 80 تكررت 3 مرات	يوجد منوالان هما : المنوال الأول = 65 المنوال الثاني = 80
قسم الإنتاج الحيواني	الدرجة 69 تكررت 3 مرات الدرجة 73 تكررت 3 مرات الدرجة 85 تكررت 3 مرات	يوجد ثلاث منوال هي : المنوال الأول = 69 المنوال الثاني = 73 المنوال الثالث = 85

مثال (3-6)

فيما يلي توزيع 30 أسرة حسب الإنفاق الاستهلاكي الشهري لها بالألف ريال .

فئات الإنفاق	2 -	5 -	8 -	11 -	14 - 17
عدد الأسر f	4	7	10	5	4

والمطلوب حساب منوال الإنفاق الشهري للأسرة، باستخدام طريقة الفروق .

الحل

لحساب المنوال لهذه البيانات يتم استخدام المعادلة رقم (3-12) ، ويتم إتباع الآتي :

• تحديد الفئة المنوالية

الفئة المنوالية هي الفئة المناظرة لأكبر تكرار : (8-11)

التكرارات	الفئات
4	2 -
7	5 -
10	8 -
5	11 -
4	14 - 17

فئة المنوال $A = 8$

$d_1 = 10 - 7 = 3$

أكبر تكرار

$d_2 = 10 - 5 = 5$

• حساب الفروق d ، حيث أن :

$$d_1 = (10 - 7) = 3 \quad d_2 = (10 - 5) = 5$$


- تحديد الحد الأدنى للفئة المنوالية ($A = 8$) ، وكذلك طول الفئة ($L = 3$)
- وبتطبيق المعادلة الخاصة بحساب المنوال في حالة البيانات المبوبة . نجد أن :

$$\begin{aligned} Mod &= A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L \\ &= 8 + \frac{3}{3 + 5} \times 3 = 8 + 1.125 = 9.125 \end{aligned}$$

3/3 استخدام مقاييس النزعة المركزية في تحديد شكل توزيع البيانات

يمكن استخدام الوسط الحسابي والوسيط والمنوال في وصف المنحنى التكراري، والذي يعبر عن شكل توزيع البيانات ، كما يلي :

شكل (3-1)



- يكون المنحنى متماثل إذا كان :
الوسط = الوسيط = المنوال .
- يكون المنحنى موجب الالتواء (ملتوي جهة اليمين) إذا كان :
الوسط > الوسيط > المنوال
- يكون المنحنى سالب الالتواء (ملتوي جهة اليسار) إذا كان :
الوسط < الوسيط < المنوال

مثال عام (7-3)

قام مدير مراقبة الإنتاج بسحب عينة من 10 عبوات من المياه المعبأة للشرب ، ذات الحجم 5 لتر ، والمنتجة بواسطة إحدى شركات تعبئة المياه لفحص كمية الأملاح الذائبة، وكانت كالتالي :

115 123 119 123 124 119 123 121 123 121

والمطلوب : حساب الوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال، ثم حدد شكل الالتواء لهذه البيانات .

الحل

حساب الوسط الحسابي :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1211}{10} = 121.1$$

• حساب الوسيط :

$$\text{رتبة الوسيط} : (n+1)/2 = (10+1)/2 = 5.5$$

ترتيب القيم تصاعديا

		قيمة الوسيط									
الطاقة		115	119	119	121	121	123	123	123	123	124
الرتبة		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		رتبة الوسيط									

عدد القيم = 10 ، وهو عدد زوجي . الوسيط = الوسط الحسابي للقيمتين رقم (5 ، 6)


$$Med = \frac{121 + 123}{2} = \frac{244}{2} = 122$$

• حساب المنوال :

المنوال يساوي القيمة الأكثر تكرارا: القيمة 123 تكررت أكثر من غيرها ، إذا

$$Mod = 123$$

وبمقارنة الوسط والوسيط و المنوال نجد أن :



نجد أن : الوسط > الوسيط > المنوال ، إذا توزيع بيانات كمية الأملاح سالبة الالتواء.

مثال (3-8)

الجدول التكراري التالي يعرض توزيع 100 عامل في مزرعة حسب الأجر اليومي بالريال .

الأجر	50 -	70 -	90 -	110 -	130 -	150 -	170 - 190
عدد العمال	8	15	28	20	15	8	6

والمطلوب :

- حساب الوسط والوسيط والمنوال .
- بيان شكل توزيع الأجر في هذه المزرعة .

الحل

- حساب الوسط والوسيط والمنوال .

أولا : الوسط الحسابي \bar{x}

فئات الأجر	التكرارات (f)	مراكز الفئات (x)	f x
50 – 70	8	60	480
70 – 90	15	80	1200
90 – 110	28	100	2800
110 - 130	20	120	2400
130 - 150	15	140	2100
150 – 170	8	160	1280
170 - 190	6	180	1080
المجموع	100		11340

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{11340}{100} = 113.4 \text{ R.S}$$

ثانيا : الوسيط *Med*

رتبة الوسيط : $(n/2 = 100/2 = 50)$

تكوين التوزيع التكراري المتجمع الصاعد .

أقل من	تكرار متجمع صاعد
أقل من 50	0
أقل من 70	8
أقل من 90	$\leftarrow f_1 23$
أقل من 110	$\leftarrow f_1 51$
أقل من 130	71
أقل من 150	86
أقل من 170	94
أقل من 190	100

رتبة الوسيط (50)

من الجدول أعلاه نجد أن :

$$\frac{n}{2} = 50 , f_1 = 23 , f_2 = 51 , A = 90 , L = 110 - 90 = 20$$

إذا الوسيط قيمته هي :

$$\begin{aligned} Med &= A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L = 90 + \frac{50 - 23}{51 - 23} \times 20 \\ &= 90 + \frac{27}{28} \times 20 = 90 + \frac{540}{28} = 90 + 19.286 = 109.3 \text{ R.S} \end{aligned}$$

ثالثا : المنوال *Mod*

الفئة المنوالية ، هي الفئة المناظرة لأكبر تكرار

أكبر تكرار = 28 ، وهو يناظر الفئة التقريبية (90 - 110) .

حساب الفروق : $d_2 = 28 - 20 = 8$ ، $d_1 = 28 - 15 = 13$

الحد الأدنى للفئة : $A = 90$ طول الفئة : $L = 110 - 90 = 20$

إذا المنوال يحسب بتطبيق المعادلة التالية :


$$Mod = A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L = 90 + \frac{13}{13 + 8} \times 20 = 90 + \frac{260}{21} = 102.4 \text{ R.S}$$

• بيان شكل التوزيع .

من النتائج السابقة ، نجد أن :

الوسط الحسابي : $\bar{x} = 113.4$ الوسيط : $Med = 109.3$ المنوال : $Mod = 102.4$

أي أن : الوسط < الوسيط < المنوال إذا توزيع بيانات الأجر موجب الالتواء . كما هو مبين في الشكل التالي:



4/3 الربعيات Quartiles


عند تقسيم القيم إلى أربع أجزاء متساوية، يوجد ثلاث إحصاءات ترتيبية تسمى بالربعيات،

وهي:

- الربيع الأول: وهو القيمة التي يقل عنها ربع عدد القيم، أي يقل عنها 25% من القيم، ويرمز له بالرمز Q_1 .
 - الربيع الثاني: وهو القيمة التي يقل عنها نصف عدد القيم، أي يقل عنها 50% من القيم، ويرمز له بالرمز Q_2 ، ومن ثم يعبر هذا الربيع عن الوسيط.
 - الربيع الثالث: وهو القيمة التي يقل عنها ثلاث أرباع عدد القيم، أي يقل عنها 75% من القيم، ويرمز له بالرمز Q_3 .
- والشكل (3-3) يبين أماكن الربيعات الثلاث.

شكل (3-3)

الربيعات



ولحساب أي من الربيعات الثلاث، يتم إتباع الآتي:

- بفرض أن عدد القيم عددها n ، وأنها مرتبة كالتالي:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{القيم مرتبة} & : & X_{(1)} & < & X_{(2)} & < & X_{(3)} & & & < & X_{(n)} \\ \text{الرتبة} & : & 1 & & 2 & & 3 & & & & n \end{array}$$

- تحديد رتبة الرباعي رقم i ، (Q_i) : $R = (n+1) \times \left(\frac{i}{4}\right)$

- إذا كانت R عددا صحيحا فإن قيمة الربيع هو: $Q_i = X_{(R)}$.

- إذا كانت R عدد كسري، فإن الرباعي (Q_i) يقع في المدى: $X_{(l)} < Q_i < X_{(u)}$ ، ومن ثم يحسب (Q_i) بالمعادلة التالية:

$$Q_i = X_{(l)} + (R - l)(X_{(u)} - X_{(l)}) \quad (3-14)$$

مثال (3-9)

فيما يلي كمية الإنتاج اليومي من الحليب باللتر للبقرة الواحدة لعينة حجمها 10 أبقار اختيرت من مزرعة معينة:

25 23 29 32 34 29 20 18 27 30

احسب الربيعات الثلاث لكمية الإنتاج، وما هو تعليقك؟

الحل:

لحساب الربيعات الثلاث، يتم إتباع الآتي:

- ترتيب القيم تصاعديا:

قيمة الربيع	22.25			28				30.5		
القيم	18	20	23	25	27	29	29	30	32	34
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رتبة الربيع	2.75			5.5				8.25		

• حساب الربيع الأول (Q_1):

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{1}{4}\right) = 2.75$$

رتبة الربيع الأول هي: $R = 2.75$ ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 2, R = 2.75, x_{(l)} = 20, x_{(u)} = 23$$

إذا:

$$Q_1 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 20 + 0.75(23 - 20) = 22.25$$

• حساب الربيع الثاني (الوسيط) Q_2

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{2}{4}\right) = 5.5$$

رتبة الربيع الثاني هي: $R = 5.5$ ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 5, R = 5.5, x_{(l)} = 27, x_{(u)} = 29$$

إذا:

$$Q_2 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 27 + 0.5(29 - 27) = 28$$

• حساب الربيع الثالث Q_3

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{3}{4}\right) = 8.25$$


رتبة الربيع الثالث هي: $R = 8.25$ ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 8, R = 8.25, x_{(l)} = 30, x_{(u)} = 32$$

إذا:

$$Q_3 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 30 + 0.25(32 - 30) = 30.5$$

من النتائج السابقة نجد أن:



• 25% من الأبقار يقل إنتاجه عن 22.25 لتر يوميا.

• 50% من الأبقار يقل إنتاجه عن 28 لتر يوميا.

- 75% من الأبقار يقل إنتاجه عن 30.5 لتر يوميا.

تمارين

أولا : استخدم البيانات التالية ، ثم أجب عما هو مطلوب باختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأربعة : فيما يلي الطاقة التصديرية من المياه بالآلف كيلومتر مكعب يوميا (x) ، لعدد 10 محطات تحليلية .

x : 342 216 105 291 107 216 210 165 90 216

-1 هذه البيانات من النوع :

(a) الكمي المنفصل
(b) الكمي المتصل
(c) الوصفي
(d) الوصفي الترتيبي

-2 $\sum x$ قيمتها:

(a) 1000 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 216

-3 قيمة الطاقة التصديرية التي أقل منها 50% من القيم تسمى :

(a) الوسيط (b) الوسط (c) التباين (d) المدى

-4 القيمة الأكثر تكرارا تسمى :

(a) الوسيط (b) الوسط (c) المنوال (d) الانحراف

-5 الوسط الحسابي للطاقة التصديرية قيمته :

(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 213

-6 المنوال قيمته

(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 347

-7 الوسيط قيمته

(a) 213 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 216

-8 تعتبر بيانات الطاقة التصديرية أعلاه لها توزيع

(a) متماثل (b) سالب الالتواء (c) موجب الالتواء (d) غير معروف .

-9 إذا تم إدخال تعديل على هذه المحطات لزيادة الطاقة التصديرية لكل محطة 50 ألف كيلو متر

مكعب ، يكون الوسط الحسابي للطاقة التصديرية بعد التطوير هو .

(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 245.8

- 10- إذا كانت $y = 0.5x$ فإن الوسط الحسابي للقيم التي يأخذها المتغير الجديد y هو :
- (a) 216 (b) 97.9 (c) 195.8 (d) 245.8
- ثانيا : فيما يلي التوزيع التكرارى لعدد 50 مزرعة حسب المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم بالألف دونم .

المساحة بالألف دونم	4.5 -	7.5 -	10.5 -	13.5 -	16.5-	19.5 - 22.5
عدد المزارع	3	8	12	15	10	2

استخدم بيانات الجدول أعلاه للإجابة على الأسئلة من (11- 20)

- 11- طول الفئة قيمته
- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 5
- 12- الحد الأدنى للفئة الرابعة هو
- (a) 14.5 (b) 16 (c) 15 (d) 13.5
- 13- مركز الفئة الثانية قيمته
- (a) 9 (b) 8 (c) 10 (d) 3
- 14- مجموع التكرار النسبي للفئات يساوى :
- (a) 0.30 (b) 0.20 (c) 1 (d) 1.50
- 15- إذا كانت x هي مركز الفئة ، f هو تكرار الفئة فإن $\sum fx$ قيمته تساوى
- (a) 225 (b) 225 (c) 50 (d) 681
- 16- الوسط الحسابي قيمته تساوى
- (a) 8.33 (b) 13.5 (c) 13.62 (d) 681
- 17- الفئة التي يقع فيها قيمة الوسيط هي :
- (a) 13.5 - 16.5 (b) 16.5- 19.5 (c) 14 - 17 (d) 10.5 - 13.5
- 18- رتبة الوسيط هي :
- (a) 50 (b) 10 (c) 25 (d) 1
- 19- الوسيط قيمته تساوى .
- (a) 13.9 (b) 13.5 (c) 15 (d) 12.5
- 20- المنوال قيمته تساوى :
- (a) 14 (b) 15 (c) 13.5 (d) 14.625

21- من الإجابة 16 ، 19 ، 20 يكون شكل التوزيع .

(a) ملتوى جهة اليمين (b) متماثل (c) سالب (d) غير محدد الإلتواء

ثالثا : قم بتسجيل البيانات التالية :

الإسم : الرقم الجامعي:

قم بتظليل الاختيار الصحيح من (1 - 21) ، ولا ينظر للإجابة التي بها مربعين مظللين :

رقم السؤال	(a)	(b)	(c)	(d)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

الفصل الرابع مقاييس التشتت

1/4 مقدمة

عند مقارنة مجموعتين من البيانات ، يمكن استخدام شكل التوزيع التكراري، أو المنحنى التكراري ، وكذلك بعض مقاييس النزعة المركزية ، مثل الوسط الحسابي والوسيط ، والمنوال ، والإحصاءات الترتيبية ، ولكن استخدام هذه الطرق وحدها لا يكفي عند المقارنة ، فقد يكون مقياس النزعة المركزية للمجموعتين متساوي ، وربما يوجد اختلاف كبير بين المجموعتين من حيث مدى تقارب وتباعدها من بعضها البعض ، أو مدى تباعد أو تقارب القيم عن مقياس النزعة المركزية .
ومثال على ذلك ، إذا كان لدينا مجموعتين من الطلاب ، وكان درجتا المجموعتين كالتالي :

المجموعة الأولى	63	70	78	81	85	67	88
المجموعة الثانية	73	78	77	78	75	74	77

لو قمنا بحساب الوسط الحسابي لكل مجموعة ، نجد أن الوسط الحسابي لكل منهما يساوي 76 درجة ، ومع ذلك درجات المجموعة الثانية أكثر تجانساً من درجات المجموعة الأولى . من أجل ذلك لجأ الإحصائيون إلى استخدام مقاييس أخرى لقياس مدى تجانس البيانات، أو مدى انتشار البيانات حول مقياس النزعة المركزية، ويمكن استخدامها في المقارنة بين مجموعتين أو أكثر من البيانات، ومن هذه المقاييس ، مقاييس التشتت ، والالتواء ، والتفرطح ، وسوف نركز في هذا الفصل على هذه المقاييس .

2/4 مقاييس التشتت Dispersion Measurements

من هذه المقاييس: المدى، والانحراف الربيعي، والانحراف المتوسط، والتباين، والانحراف المعياري .

Rang المدى 1/2/4

هو أبسط مقاييس التشتت ، ويحسب المدى في حالة البيانات غير المبوبة بتطبيق المعادلة التالية .

$$\text{المدى في حالة البيانات غير المبوبة} = \text{أكبر قراءة} - \text{أقل قراءة}$$
$$Rang = Max - Min$$

(٤-١)

وأما المدى في حالة البيانات المبوبة له أكثر من صيغة، ومنها المعادلة التالية:

$$\text{المدى في حالة البيانات المبوبة} = \text{مركز الفئة الأخيرة} - \text{مركز الفئة الأولى} \quad (4-3)$$

مثال (4-1)

تم زراعة 9 وحدات تجريبية بمحصول القمح ، وتم تسميدها بنوع معين من الأسمدة الفسفورية ، وفيما يلي بيانات كمية الإنتاج من القمح بالطن/ هكتار .

4.8 6.21 5.4 5.18 5.29 5.18 5.08 4.63 5.03

والمطلوب حساب المدى .

الحل

المدى = أكبر قراءة - أقل قراءة

$$\text{أكبر قراءة} = 6.21 \quad \text{أقل قراءة} = 4.63$$

إذا المدى هو :

$$\text{Rang} = \text{Max} - \text{Min} = 6.21 - 4.63 = 1.58$$

المدى يساوي 1.58 طن / هكتار.

مثال (4-2)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع 60 مزرعة حسب المساحة المزروعة بالذرة بالهكتار .

المساحة	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
عدد المزارع	3	9	15	18	12	3

والمطلوب حساب المدى للمساحة المزروعة بالذرة .

الحل

المدى = مركز الفئة الأخيرة - مركز الفئة الأولى

مركز الفئة الأخيرة: $(40+45)/2=85/2=42.5$ مركز الفئة الأولى: $(15+20)/2=35/2=17.5$

$$\text{Rang} = 42.5 - 17.5 = 25 \quad \text{إذا}$$

أي أن المدى قيمته تساوي 25

مزايا وعيوب المدى

من مزايا المدى

1 - أنه بسيط وسهل الحساب

2 - يكشر استخدامه عند الإعلان عن حالات الطقس، و المناخ الجوي، مثل درجات الحرارة، والرطوبة، والضغط الجوي.

3 - يستخدم في مراقبة الجودة .

2 -ومن عيوبه

- أنه يعتمد على قيمتين فقط ، ولا يأخذ جميع القيم في الحسبان .
- يتأثر بالقيم الشاذة .

2/2/4 الانحراف الربيعي (Q) Quartile Deviation (Q)

يعتمد المدى على قيمتين متطرفتين ، هما أصغر قراءة ، وأكبر قراءة ، فإذا كان هناك قيم شاذة، ترتب على استخدامه كمقياس للتشتت نتائج غير دقيقة، من أجل ذلك لجأ الإحصائيون، إلى استخدام مقياس للتشتت يعتمد على نصف عدد القيم الوسطى، ويهمل نصف عدد القيم المتطرفة، ولذا لا يتأثر هذا المقياس بوجود قيم شاذة، ويسمى هذا المقياس بالانحراف الربيعي (Q)، ويحسب الانحراف الربيعي بتطبيق المعادلة التالية .

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} \quad (3-4)$$

حيث أن Q_1 هو الربيع الأول ، Q_3 هو الربيع الثالث ، وقد بينا في الفصل الثالث كيف يمكن حساب هذان الرباعيان ، ومن المعادلة أعلاه ، يعرف الانحراف الربيعي بنصف المدى الربيعي ، أي أن :

الانحراف الربيعي = نصف المدى الربيعي

مثال(3-4)

استخدم بيانات مثال (1-4) ، ثم احسب الانحراف الربيعي لكمية الإنتاج من القمح .

الحل

- ترتيب القيم تصاعديا

الإنتاج	4.63	4.8	5.03	5.08	5.18	5.18	5.29	5.4	6.21
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- حساب الربيع الأول Q_1

$$\text{رتبة الربيع الأول: } (n+1)\left(\frac{1}{4}\right) = (9+1)(0.25) = 2.5$$

$$x_{(l)} = x_{(2)} = 4.8 , x_{(u)} = x_{(3)} = 5.03 , R = 2.5 , l = 2 , R - l = 0.5$$

إذا

$$Q_1 = x_{(l)} + (r-l)(x_{(u)} - x_{(l)})$$

$$= 4.8 + 0.5(5.03 - 4.8) = 4.915$$

• حساب الرباعي الثالث (Q₃)

$$(n+1)\left(\frac{3}{4}\right) = (9+1)(0.75) = 7.5 \quad \text{موقع الرباعي الثالث:}$$

$$x_{(l)} = x_{(7)} = 5.29, \quad x_{(u)} = x_{(8)} = 5.4, \quad R = 7.5, \quad l = 7, \quad R-l = 0.5$$

إذا

$$Q_3 = x_{(l)} + (R-l)(x_{(u)} - x_{(l)})$$

$$= 5.29 + 0.5(5.4 - 5.29) = 5.345$$

• حساب الانحراف الربيعي

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{5.345 - 4.915}{2} = 0.215$$

إذا الانحراف الربيعي قيمته تساوي 0.215 طن / هكتار .

مثال (4-4)

استخدم بيانات مثال رقم (4-2) في حساب نصف المدى الربيعي .

الحل:

عند حساب الربيع الأول أو الثالث يتبع نفس الأسلوب المستخدم في حساب الوسيط.

• تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد

• حساب الرباعي الأول (Q₁)

$$n(1/4) = 60(0.25) = 15 \quad \text{رتبة الربيعي الأول:}$$

$$f = 15, \quad f_1 = 12, \quad f_2 = 27, \quad A = 25, \quad L = 5$$

$$Q_1 = A + \frac{f - f_1}{f_2 - f_1} L$$

إذا

$$= 25 + \frac{15 - 12}{27 - 12} (5) = 25 + \frac{3}{15} (5) = 26$$

حدود المساحة	عدد المزارع	أقل من	تكرار متجمع
15-	3	15	0
20-	9	20	3
25-	15	A 25	f_1 12
30-	18	30	f_2 27
35-	12	A 35	45
40-45	3	40	57
sum	60	45	60

• حساب الرباعي الثالث (Q_3)

$$n(3/4) = 60(0.75) = 45 \quad \text{موقع الرباعي الثالث :}$$

$$f = 45, f_1 = 45, f_2 = 57, A = 35, L = 5$$

إذا

$$Q_3 = A + \frac{f - f_1}{f_2 - f_1} L$$

$$= 35 + \frac{45 - 45}{57 - 45} (5) = 35 + \frac{(0)}{15} (5) = 35$$

• نصف المدى الربيعي .

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{35 - 26}{2} = 4.5$$

إذا الانحراف الربيعي للمساحة 4.5 ألف دونم.

مزايا وعيوب الانحراف الربيعي

من مزايا الانحراف الربيعي، يفضل استخدامه كمقياس للتشتت في حالة وجود قيم شاذة ، كما أنه بسيط وسهل في الحساب . ومن عيوبه ، أنه لا يأخذ كل القيم في الاعتبار .

3/2/4 الانحراف المتوسط Mean Deviation (MD)

هو أحد مقاييس التشتت، ويعبر عنه بمتوسط الانحرافات المطلقة للقيم عن وسطها الحسابي ، فإذا كانت x_1, x_2, \dots, x_n هي القراءات التي تم أخذها عن ظاهرة معينة ، وكان $\bar{x} = \sum x/n$ ، عبارة عن الوسط الحسابي لهذه القراءات، فإن الانحراف المتوسط (MD) يحسب بتطبيق المعادلة التالية:

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} \quad (4-4)$$

وهذه الصيغة تستخدم في حالة البيانات غير المبوبة .

مثال (4-5)

إذا كانت الطاقة التصديرية لخمس محطات لتحلية المياه بالمليون متر مكعب كما يلي:

4 5 2 10 7

أوجد قيمة الانحراف المتوسط للطاقة التصديرية

الحل

لحساب قيمة الانحراف المتوسط يتم استخدام المعادلة (4-4)

• الوسط الحسابي :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{28}{5} = 5.6$$

ويتم تكوين الجدول التالي :

الطاقة التصديرية x	الانحرافات $(x - 5.6)(x - \bar{x}) =$	الانحرافات المطلقة $ x - 5.6 $
4	4 - 5.6 = -1.6	1.6
5	5 - 5.6 = -0.6	0.6
2	2 - 5.6 = -3.6	3.6
10	10 - 5.6 = 4.4	4.4
7	7 - 5.6 = 1.4	1.4
Sum	0	11.6

• إذا الانحراف المتوسط قيمته هي :

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} = \frac{11.6}{5} = 2.32 \text{ (مليون متر مكعب)}$$

وفي حالة البيانات المبوبة، يحسب الانحراف المتوسط باستخدام المعادلة التالية .

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{n} \quad (4-5)$$

حيث أن f هو تكرار الفئة ، x هو مركز الفئة ، \bar{x} هو الوسط الحسابي.

مثال (4-6)

يبين الجدول التكراري التالي توزيع 40 أسرة حسب الإنفاق الشهري بالألف ريال.

الإنفاق	2 - 5	5 - 8	8 - 11	11 - 14	14 - 17
عدد الأسرة	1	8	13	10	8

أوجد الانحراف المتوسط .

الحل

لحساب الانحراف المتوسط ، يتم تطبيق المعادلة (4-5)، ويتبع الآتي

• تكوين جدول لحساب مكونات المعادلة:

حدود الإنفاق	عدد الأسر f	مركز الفئة x	$x f$	الوسط الحسابي \bar{x}	$ x - \bar{x} $	$ x - \bar{x} f$
2-5	1	3.5	3.5	$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{428}{40} = 10.7$	7.2	7.2
5-8	8	6.5	52		4.2	33.6
8-11	13	9.5	123.5		1.2	15.6
11-14	10	12.5	125		1.8	18
14-17	8	15.5	124		4.8	38.4
sum	40		428			

إذا الانحراف المتوسط هو :

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{n} = \frac{112.8}{40} = 2.82$$

الانحراف المتوسط للإنفاق الشهري هو 2.82 ألف ريال .

مزايا وعيوب الانحراف المتوسط

من مزايا الانحراف المتوسط أنه يأخذ كل القيم في الاعتبار، ولكن يعاب عليه ما يلي:

- يتأثر بالقيم الشاذة .
- يصعب التعامل معه رياضياً .

4/2/4 التباين Variance

هو أحد مقاييس التشتت ، وأكثرها استخداماً في النواحي التطبيقية ، ويعبر عن متوسط

مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي .

أولاً: التباين في المجتمع (σ^2)

إذا توافر لدينا قراءات عن كل مفردات المجتمع ، ولتكن: x_1, x_2, \dots, x_N ، فإن التباين

في المجتمع ، ويرمز له بالرمز σ^2 (سيجما) يحسب باستخدام المعادلة التالية :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - u)^2}{N} \quad (4-7)$$

حيث أن μ هو الوسط الحسابي في المجتمع ، أي أن: $\mu = \sum x / N$.

مثال(4-7)

مصنع لتعبئة المواد الغذائية ، يعمل به 15 عامل ، وكانت عدد سنوات الخبرة لهؤلاء العمال

كما يلي :

5 13 7 14 12 9 6 8 10 13 14 6 11 12 10

يفرض أن هذه البيانات تم جمعها عن كل مفردات المجتمع ، فأوجد التباين لعدد سنوات الخبرة .

الحل

لحساب تباين سنوات الخبرة في المجتمع ، يتم استخدام المعادلة (6-4).

• الوسط الحسابي في المجتمع μ

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{N} \sum x \\ &= \frac{1}{15} (5+13++7+...+12+10) = \frac{1}{15} (150) = 10\end{aligned}$$

• حساب مربعات الانحرافات $\sum (x_i - \bar{X})^2$

$$\sum (X - \bar{X})^2 = 130 \quad \text{بما أن:}$$

إذا تباين سنوات الخبرة للعمال في المصنع هو :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} = \frac{130}{15} = 8.67$$

سنوات الخبرة x	$(x - \mu)$	$(x - \mu)^2$
5	5-10 = -5	25
13	3	9
7	-3	9
14	4	16
12	2	4
9	-1	1
6	-4	16
8	-2	4
10	0	0
13	3	9
14	4	16
6	-4	16
11	1	1
12	2	4
10	0	0
150	0	130

ويمكن تبسيط المعادلة (6-4) في صورة أخرى كما يلي :

يمكن فك المجموع $\sum (x - \mu)^2$ كالتالي :

$$\begin{aligned}
\sum(x-\mu)^2 &= \sum(x^2 - 2x\mu + \mu^2) \\
&= \sum x^2 - 2\mu\sum x + \sum \mu^2 \\
&= \sum x^2 - 2N\mu^2 + N\mu^2 \\
&= \sum x^2 - N\mu^2
\end{aligned}$$

ومن ثم يكتب تباين المجتمع على الصورة التالية :

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - N\mu^2}{N} = \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2$$

إذا التباين في المجتمع يمكن صياغته كالتالي .

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2 \quad (7-4)$$

وبالتطبيق على المثال (7-4) ، نجد أن أننا نحتاج إلى المجموعين : $\sum x$ ، $\sum x^2$ ، ويتم عمل

الآتي :

سنوات الخبرة x	x^2
5	25
13	169
7	49
14	196
12	144
9	81
6	36
8	64
10	100
13	169
14	196
6	36
11	121
12	144
10	100
150	1630

$$\sum x = 150 , \sum x^2 = 1630$$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum x = \frac{1}{15} (150) = 10$$

إذا التباين هو

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2 \\
&= \frac{1}{15} 1630 - 10^2 = 108.67 - 100 = 8.67
\end{aligned}$$

وهي نفس النتيجة التي تم الحصول عليها باستخدام الصيغة (6-4) .

ثانياً: التباين في العينة (s^2)

في كثير من الحالات يكون تباين المجتمع σ^2 غير معلوم، وعندئذ يتم سحب عينة من هذا المجتمع ، ويحسب التباين من بيانات العينة كتقدير لتباين المجتمع ، فإذا كانت قراءات عينة عشوائية حجمها n هي ، x_1, x_2, \dots, x_n ، فإن تباين العينة ويرمز له بالرمز s^2 هو :

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} \quad (8-4)$$

حيث أن \bar{x} هو الوسط الحسابي لقراءات العينة ، أي أن : $\bar{x} = \sum x/n$ ، وتباين العينة المبين بالمعادلة (8-4) هو التقدير غير المتحيز لتباين المجتمع .

مثال (8-4)

في المثال (7-4) السابق ، إذا تم سحب عينة من عمال المصنع حجمها 5 عمال ، وسجل عدد سنوات الخبرة ، وكانت كالتالي .

8 13 10 5 9

احسب تباين سنوات الخبرة في العينة .

الحل

لحساب التباين في العينة يتم تطبيق المعادلة (8-4) ، ويتبع الآتي :

• الوسط الحسابي في العينة :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x = \frac{1}{5} (8+13+10+5+9) = \frac{1}{5} (45) = 9$$

• حساب مربعات الانحرافات $\sum (x - \bar{x})^2$

سنوات الخبرة x	8	13	10	5	9	45
$(x - \bar{x})$	-1	4	1	-4	0	0
$(x - \bar{x})^2$	1	16	1	16	0	34

أي أن : $\sum (x - \bar{x})^2 = 34$ ،

• إذا تباين سنوات الخبرة في العينة قيمته هي :

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{34}{(5-1)} = \frac{34}{4} = 8.5$$

• في هذه الحالة يمكن القول بأن تباين العينة 8.5 ، وهو في نفس الوقت تقدير غير متحيز لتباين المجتمع .

تبسيط العمليات الحسابية

يمكن تبسيط الصيغة الرياضية لتباين العينة الموضحة بالمعادلة (8-4) إلى صيغة سهلة يمكن التعامل معها، وخاصة إذا كانت البيانات تحتوي على قيم كسرية، ولاستنتاج هذه الصيغة يتم إتباع الآتي.

يمكن فك المجموع $\sum (x - \bar{x})^2$ كالتالي:

$$\begin{aligned}\sum (x - \bar{x})^2 &= \sum (x^2 - 2x\bar{x} + \bar{x}^2) \\ &= \sum x^2 - 2\bar{x}\sum x + \sum \bar{x}^2 \\ &= \sum x^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \\ &= \sum x^2 - n\bar{x}^2\end{aligned}$$

ويكتب تباين العينة على الصورة التالية :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

إذا التباين في العينة يمكن صياغته كالتالي .

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - n\bar{x}^2 \right) \quad (9-4)$$

كما يمكن إثبات أن المعادلة (9-4) تأخذ الشكل التالي:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right) \quad (10-4)$$

وبالتطبيق على بيانات المثال السابق ، نجد أن :

سنوات الخبرة x	8	13	10	5	9	45
x^2	64	169	100	25	81	439

• تباين العينة باستخدام المعادلة (9-4) هو :

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - n\bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{5-1} \left(439 - 5(9)^2 \right) = \frac{1}{4} (34) = 8.5\end{aligned}$$

- وباستخدام المعادلة (4-10) نجد أن:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right)$$

$$= \frac{1}{5-1} \left(439 - \frac{(45)^2}{5} \right) = \frac{1}{4} (439 - 405) = \frac{1}{4} (34) = 8.5$$

الانحراف المعياري Standard Deviation

عند استخدام التباين كمقياس من مقاييس التشتت، نجد أنه يعتمد علي مجموع مربعات الانحرافات، ومن ثم لا يتمشى هذا المقياس مع وحدات قياس المتغير محل الدراسة، ففي المثال السابق، نجد أن تباين سنوات الخبرة في العينة 8.5، فليس من المنطق عند تفسير هذه النتيجة أن نقول، " تباين سنوات الخبرة هو 8.5 سنة تربيع"، لأن وحدات قياس المتغير هو عدد السنوات، من أجل ذلك لجأ الإحصائيين إلى مقياس منطقي يأخذ في الاعتبار الجذر التربيعي للتباين، لكي يناسب وحدات قياس المتغير، وهذا المقياس هو الانحراف المعياري.

إذا الانحراف المعياري، هو الجذر التربيعي الموجب للتباين، أي أن:

$$\boxed{\text{التباين}} = \sqrt{\text{الانحراف المعياري}} \quad (4-11)$$

ومثال علي ذلك:

- في مثال (4-7) نجد أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة لعمال المصنع (المجتمع)، ويرمز له بالرمز (σ) هو:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{15} 1630 - 10^2} = \sqrt{8.67} = 2.94$$

في هذه الحالة، يكون الانحراف المعياري لسنوات الخبرة في المجتمع هو 2.94 سنة.

- في مثال (4-8) نجد أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة لعمال العينة، ويرمز له بالرمز s ، هو:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{5-1} \left(439 - \frac{(45)^2}{5} \right)} = \sqrt{\frac{1}{4} (439 - 405)} = \sqrt{\frac{1}{4} (34)} = 2.92$$

أي أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة في العينة هو 2.92 سنة .

الانحراف المعياري في حالة البيانات المبوبة

إذا كانت بيانات الظاهرة ، مبوبة في جدول توزيع تكراري ، فإن الانحراف المعياري يحسب بتطبيق المعادلة التالية .

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{n - 1}}$$

or

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 f - \frac{(\sum xf)^2}{n}}{n - 1}} \quad (12-4)$$

حيث أن f هو تكرار الفئة ، x هو مركز الفئة ، \bar{x} هو الوسط الحسابي $(\sum xf/n)$ ، n هي مجموع التكرارات $(n = \sum f)$ ، والمقدار الذي تحت الجذر يعبر عن التباين (s^2) .

مثال (4-9)

في بيانات مثال (4-6) ، احسب الانحراف المعياري للإنفاق الشهري للأسرة ، ثم قارن بين الانحراف المتوسط ، والانحراف المعياري للإنفاق الشهري للأسرة .

الحل

لحساب الانحراف المعياري للإنفاق الشهري ، تستخدم المعادلة رقم (4-12) ، وسوف نطبق الصيغة الثانية ، ولذا نكون جدول لحساب المجموعين : $\sum xf$ ، $\sum x^2 f$.

الإنفاق	عدد الأسر f	مركز الفئة x	xf	$x^2 f$
2-5	1	3.5	3.5	12.25

$$n = \sum f = 40$$

$$\sum xf = 428$$

5-8	8	6.5	52	338
8-11	13	9.5	123.5	1173.25
11-14	10	12.5	125	1562.5
14-17	8	15.5	124	1922
sum	40		428	5008

$$\sum x^2 f = 5008$$

وبتطبيق المعادلة ، نجد أن الانحراف المعياري قيمته هي :

$$\begin{aligned}
s &= \sqrt{\frac{\sum x^2 f - \frac{(\sum xf)^2}{n}}{n-1}} \\
&= \sqrt{\frac{5008 - \frac{(428)^2}{40}}{40-1}} = \sqrt{\frac{5008 - 4579.6}{39}} \\
&= \sqrt{10.984615} = 3.314
\end{aligned}$$

أي أن الانحراف المعياري للإنتاج الشهري 3.314 ألف ريال ، ووفقا لهذا المقياس ، فإن تشتت بيانات الإنتاج أكبر من تشتت بيانات الإنتاج وفقا لمقياس الانحراف المتوسط (2.88) .

خصائص الانحراف المعياري

من خصائص الانحراف المعياري ، ما يلي :

- أولا : الانحراف المعياري للمقدار الثابت يساوي صفرا ، أي أنه إذا كان لدينا القراءات التالية:
 $x: a, a, a, \dots, a$ حيث أن مقدار ثابت فإن $S_x = 0$ ، حيث أن S_x تعبر عن الانحراف المعياري لقيم x .

- ثانيا : إذا أضيف مقدار ثابت إلى كل قيمة من قيم المفردات ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة (القيم بعد الإضافة) تساوي الانحراف المعياري للقيم الأصلية (القيم بعد الإضافة) ، فإذا كانت القيم الأصلية هي x_1, x_2, \dots, x_n ، وتم إضافة مقدار ثابت a إلى كل قيمة من قيم x ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة : $x_1 + a, x_2 + a, \dots, x_n + a$: $(y = x + a)$ هي : $S_y = S_x$:

مثال(4-10)

إذا كان من المعلوم أن تطبيق برنامج غذائي معين للتسمين لفترة زمنية محددة سوف يزيد من وزن الدجاجة 0.5 كيلوجرام، سحبت عينة عشوائيا من مزرعة دجاج حجمها 5 دجاجات، وكانت أوزانها

كالتالي: 1, 1.75, 2, 1.25, 2.5 .

1 - احسب الانحراف المعياري لوزن الدجاجة.

2 - إذا طبق البرنامج الغذائي المشار إليه، ما هو الانحراف المعياري لوزن الدجاجة في هذه العينة؟

الحل

1- حساب الانحراف المعياري للوزن قبل تطبيق البرنامج .

x	x^2
1	1
1.75	3.0625
2	4
1.25	1.5625
2.5	6.25
8.5	15.875

$$n = 5$$

$$\sum x = 8.5$$

$$\sum x^2 = 15.875$$

إذا الانحراف المعياري للوزن قبل البرنامج في العينة هو:

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{15.875 - \frac{(8.5)^2}{5}}{5}} = \sqrt{\frac{15.875 - 14.45}{5}} = 0.534$$

$$= \sqrt{10.984615} = 3.314$$

2- حساب الانحراف المعياري لوزن الدجاجة بعد تطبيق البرنامج .

كل دجاجة بعد تطبيق البرنامج، من المتوقع أن تزيد 0.5 كيلوجرام ، وهذا معناه أن الوزن بعد البرنامج هو : $y = x + 0.5$ ، ويكون الانحراف المعياري للوزن الجديد مساويا أيضا للانحراف المعياري للقيم الأصلية ، أي أن :

$$s_y = s_x = 0.534$$

الانحراف المعياري للوزن بعد تطبيق البرنامج يساوي 0.534 كيلوجرام .

- ثالثا : إذا ضرب كل قيمة من قيم المفردات في مقدار ثابت ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة ، يساوي الانحراف المعياري للقيم الأصلية مضروبا في الثابت ، أي أن إذا كان قيم x هي القيم الأصلية ، وكانت القيم الجديدة هي : $y = ax$ ، حيث أن a مقدار ثابت ، فإن : $s_y = as_x$.

ومثال على ذلك ، إذا كان الانحراف المعياري لدرجات عينة من الطلاب هي 4 درجات ، وإذا كان

التصحیح من 50 درجة ، ويراد تعديل الدرجة ليكون التصحيح من 100 درجة، ومعنى يتم ضرب كل درجة من الدرجات الأصلية في 2 ، ومن ثم يحسب الانحراف المعياري للدرجات المعدلة كالتالي .

$$y = 2x$$

$$s_y = 2s_x = 2(4) = 8$$

إذا الانحراف المعياري للدرجات المعدلة 8 درجات .

• رابعا: إذا كان لدينا التوليفة الخطية : $y = ax + b$ ، فإن الانحراف المعياري للمتغير y هو أيضا : $s_y = as_x$ ، وفي المثال السابق ، لو أضف المصحح لكل طالب 5 درجات بعد تعديل الدرجة من 100 ، أي أن الدرجة الجديدة هي : $y = 2x + 5$ ، فإن الانحراف المعياري هو :

$$y = 2x + 5$$

$$s_y = 2s_x = 2(4) = 8$$

مزايا وعيوب الانحراف المعياري

من مزايا الانحراف المعياري

1- أنه أكثر مقاييس التشتت استخداما .

2 -يسهل التعامل معه رياضيا .

3 -يأخذ كل القيم في الاعتبار .

ومن عيوبه ، أنه يتأثر بالقيم الشاذة .

الفصل السادس

الارتباط والانحدار الخطي البسيط

1/6 مقدمة


في الفصول الثلاث السابقة تم عرض بعض المقاييس الوصفية، مثل مقاييس النزعة المركزية، والتشتت، ومقاييس الالتواء والتفرطح، وغيرها من المقاييس الأخرى والتي يمكن من خلالها وصف شكل توزيع البيانات التي تم جمعها عن متغير واحد، ومنتقل من التعامل مع متغير واحد إلى التعامل مع متغيرين أو أكثر، ويتناول هذا الفصل دراسة وتحليل العلاقة بين متغيرين، وذلك باستخدام بعض طرق التحليل الإحصائي مثل تحليل الارتباط، والانحدار الخطي البسيط، فإذا كان اهتمام الباحث هو دراسة العلاقة بين متغيرين استخدم لذلك أسلوب تحليل الارتباط، وإذا كان اهتمامه بدراسة أثر أحد المتغيرين على الآخر استخدم لذلك أسلوب تحليل الانحدار، ومن الأمثلة على ذلك:

- 1 - الإنفاق، والدخل العائلي.
- 2 - سعر السلعة، والكمية المطلوبة منها.
- 3 - الفترة الزمنية لتخزين الخبز، وعمق طراوة الخبز.
- 4 - تقديرات الطلاب في مقرر الإحصاء، وتقديراتهم في مقرر الرياضيات.
- 5 - كميات السماد المستخدمة، وكمية الإنتاج من محصول معين تم تسميده بهذا النوع من السماد.
- 6 - عدد مرات ممارسة نوع معين من الرياضة البدنية، ومستوى الكليسترول في الدم.
- 7 - وزن الجسم، وضغط الدم.

والأمثلة على ذلك في المجال التطبيقي كثيرة، فإذا كان لدينا المتغيرين (X, Y) ، وتم جمع بيانات عن أزواج قيم هذين المتغيرين، وتم تمثيلها بيانيا فيما يسمى بشكل الانتشار، فإن العلاقة بينها تأخذ أشكالاً مختلفة على النحو التالي :

شكل(6-1)

شكل الانتشار لبيان نوع العلاقة بين X , Y



2/6 الارتباط الخطي البسيط Simple Correlation

إذا كان الغرض من التحليل هو تحديد نوع وقوة العلاقة بين متغيرين ، يستخدم تحليل الارتباط ، وأما إذا كان الغرض هو دراسة وتحليل أثر أحد المتغيرين على الآخر ، يستخدم تحليل الانحدار، وفي هذا الفصل يتم عرض أسلوب تحليل الارتباط الخطي البسيط، أي في حالة افتراض أن العلاقة بين المتغيرين تأخذ الشكل الخطي ، وسوف يجرى حسابه في حالة البيانات الكمية ، والبيانات الوصفية المقاسة بمقيار ترتيبي.

1/2/6 الغرض من تحليل الارتباط الخطي البسيط

الغرض من تحليل الارتباط الخطي البسيط هو تحديد نوع وقوة العلاقة بين متغيرين، ويرمز له في حالة المجتمع بالرمز ρ (رو)، وفي حالة العينة بالرمز r ، وحيث أننا في كثير من النواحي التطبيقية نتعامل مع بيانات عينة مسحوبة من المجتمع، سوف نهتم بحساب معامل الارتباط في العينة r كتقدير لمعامل الارتباط في المجتمع، ومن التحديد السابق للغرض من معامل الارتباط، نجد أنه يركز على نقطتين هما:

- نوع العلاقة: وتأخذ ثلاث أنواع حسب إشارة معامل الارتباط كما يلي:
 - 1 - إذا كانت إشارة معامل الارتباط سالبة ($r < 0$) توجد علاقة عكسية بين المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير الثاني، والعكس.
 - 2 - إذا كانت إشارة معامل الارتباط موجبة ($r > 0$) توجد علاقة طردية بين المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه زيادة في المتغير الثاني، والعكس .
 - 3 - إذا كان معامل الارتباط قيمته صفراً ($r = 0$) دل ذلك على انعدام العلاقة بين المتغيرين.
- قوة العلاقة: ويمكن الحكم على قوة العلاقة من حيث درجة قربها أو بعدها عن (± 1) ، حيث أن قيمة معامل الارتباط تقع في المدى ($-1 < r < 1$)، وقد صنف بعض الإحصائيين درجات لقوة العلاقة يمكن تمثيلها على الشكل التالي:

شكل (6-2)

درجات قوة معامل الارتباط

ارتباط عكسي					ارتباط طردي					
قوي جدا	قوي	متوسط	ضعيف	ضعف جدا	ضعف جدا	ضعيف	متوسط	قوي	قوي جدا	
-1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0	0.3	0.5	0.7	0.9	1
نام					متعادلا					نام

2/2/6 معامل الارتباط الخطي البسيط " لبيرسون " Pearson

في حالة جمع بيانات عن متغيرين كميين (y, x) ، يمكن قياس الارتباط بينهما، باستخدام طريقة "بيرسون" Pearson، ومن الأمثلة على ذلك: قياس العلاقة بين الوزن والطول، والعلاقة بين الإنتاج والتكلفة، والعلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل، والعلاقة بن الدرجة التي حصل عليها الطالب وعدد ساعات الاستذكار، وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة. ولحساب معامل الارتباط في العينة، تستخدم صيغة "بيرسون" التالية :

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{(n-1)} \div \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n-1)}} \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{(n-1)}} \quad (1-6)$$

حيث أن :

$$S_{xy} = \sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) / (n-1) \text{ : هو التباين بين } (y, x)$$

$$S_x = \sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 / (n-1)} \text{ : هو الانحراف المعياري لقيم } (x)$$

$$S_y = \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2 / (n-1)} \text{ : هو الانحراف المعياري لقيم } (y)$$

ويمكن اختصار الصيغة السابقة على النحو التالي:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} \quad (2-6)$$

مثال (1-6)

فيما يلي المساحة المنزوعة بالأعلاف الخضراء بالألف هكتار، وإجمالي إنتاج اللحوم بالألف طن، خلال الفترة من 1995 حتى عام 2002.

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
المساحة	305	313	297	289	233	214	240	217
الكمية	592	603	662	607	635	699	719	747

والمطلوب: حساب معامل الارتباط بين المساحة والكمية، وما هو مدلوله ؟

الحل

بفرض أن (x) هي المساحة المنزرعة، (y) هي الكمية، ولحساب معامل الارتباط بين (y, x) يتم تطبيق المعادلة (6-2)، وذلك على النحو التالي:

- حساب الوسط الحسابي لكل من المساحة، والكمية (\bar{y}, \bar{x}) .

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{2108}{8} = 263.5, \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{5264}{8} = 658$$

• حساب المجاميع

x	y	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
305	592	41.5	1722.25	-66	4356	-2739
313	603	49.5	2450.25	-55	3025	-2722.5
297	662	33.5	1122.25	4	16	134
289	607	25.5	650.25	-51	2601	-1300.5
233	635	-30.5	930.25	-23	529	701.5
214	699	-49.5	2450.25	41	1681	-2029.5
240	719	-23.5	552.25	61	3721	-1433.5
217	747	-46.5	2162.25	89	7921	-4138.5
2108	5264	0	12040	0	23850	-13528

$$\sum (x - \bar{x})^2 = 12040, \quad \sum (y - \bar{y})^2 = 23850,$$

$$\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) = -13528$$

إذا معامل الارتباط قيمته هي:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} = \frac{-13528}{\sqrt{12040} \sqrt{23850}}$$

$$= \frac{-13528}{(109.727)(154.434)} = \frac{-13528}{16945.619} = -0.798$$

• يوجد ارتباط عكسي قوي بين المساحة المنزرعة، وكمية إنتاج اللحوم.

تبسيط العمليات الحسابية:

في بعض الأحيان، يكون استخدام صيغة المعادلة (6-2) في غاية الصعوبة، خاصة إذا لازم العمليات الحسابية قيما كسرية، من أجل ذلك يمكن تبسيط الصيغة (6-2) إلى صيغة أسهل تعتمد على مجموع القيم وليس على انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، وهذه الصيغة هي:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

(٦-٣)

وبالتطبيق على بيانات المثال السابق ، يتبع الآتي :

• حساب المجاميع :

x	y	xy	x ²	y ²
305	592	180560	93025	350464
313	603	188739	97969	363609
297	662	196614	88209	438244
289	607	175423	83521	368449
233	635	147955	54289	403225
214	699	149586	45796	488601
240	719	172560	57600	516961
217	747	162099	47089	558009
2108	5264	1373536	567498	3487562

المجاميع المطلوبة
$\sum x = 2108$, $\sum y = 5264$
$\sum xy = 1373536$
$\sum x^2 = 567498$
$\sum y^2 = 3487562$

• حساب معامل الارتباط :

باستخدام المجاميع السابقة، وبالتطبيق على المعادلة (٦-٣) أعلاه، نجد أن معامل الارتباط قيمته هي :

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

$$= \frac{1373536 - \frac{(2108)(5264)}{8}}{\sqrt{\left(567498 - \frac{(2108)^2}{8}\right)\left(3487562 - \frac{(5264)^2}{8}\right)}}$$

$$= \frac{-13528}{\sqrt{(12040)(23850)}} = \frac{-13528}{16945.619} = -0.798$$

وهي نفس النتيجة السابقة :

3/2/6 معامل ارتباط الرتب (اسبيرمان) Spearman

إذا كانت الظاهرة محل الدراسة تحتوي على متغيرين وصفيين ترتيبيين، ومثال على ذلك قياس العلاقة بين تقديرات الطلبة في مادتين ، أو العلاقة بين درجة تفضيل المستهلك لسلعة معينة ، ومستوى الدخل، فإنه يمكن استخدام طريقة "بيرسون" السابقة في حساب معامل ارتباط يعتمد على رتب

مستويات المتغيرين كبديل للقيم الأصلية ، ويطلق على هذا المعامل " معامل ارتباط اسيرمان " Spearman ، ويعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)} \quad (4-6)$$

حيث أن d هي الفرق بين رتب مستويات المتغير الأول X ، ورتب مستويات المتغير الثاني Y ، أي أن $d = R_x - R_y$:

مثال (2-6)

فيما يلي تقديرات 10 طلاب في مادتي الإحصاء، والاقتصاد:

تقديرات إحصاء	أ	ج+	د	د+	ب+	ج+	أ+	ب	ب+	ب+
تقديرات اقتصاد	أ+	د	ج	ج	أ	ب	ب+	ب	ج	ب

والمطلوب:

1 - احسب معامل الارتباط بين تقديرات الطلبة في المقررين.

2 - وما هو مدلوله ؟

الحل

1 - نفرض أن X هي تقديرات الإحصاء، Y هي تقديرات الاقتصاد، يمكن حساب معامل الارتباط بينهما باستخدام المعادلة (4-6)، وذلك بإتباع الآتي:

الرتب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
تقديرات إحصاء	أ+	د	ب+	ب+	ب+	ب	ج+	ج+	د	د
رتب X	1	2	$(3+4+5)/3=4$			6	$(7+8)/2=7.5$		9	10
تقديرات اقتصاد	أ+	د	ب+	ب	ب	ب	ج-	ج-	ج-	د
رتب Y	1	2	3	$(4+5+6)/3=5$			$(7+8+9)/3=8$			10

• إذا يمكن حساب المجموع: $\sum d^2$ كما يلي:

X	Y	رتب X	رتب Y	d	d^2
أ	أ+	2	1	1	1
ج+	د	7.5	10	-2.5	6.25
د	ج	10	8	2	4
د+	ج	9	8	1	1
ب+	أ	4	2	2	1
ج+	ب	7.5	5	2.5	6.25
أ+	ب+	1	3	-2	4

$$\sum d^2 = 44.5$$

• معامل الارتباط هو:

ب	ب	6	5	1	1
+ب	ج	4	8	-4	16
+ب	ب	4	5	-1	1
					44.5

$$r = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$= 1 - \frac{6(44.5)}{10(10^2 - 1)} = 1 - \frac{267}{990}$$

$$= 1 - 0.2697 = 0.7303$$

2 - جدول معامل الارتباط :

بما أن $r = 0.703$ ، ويدل ذلك على وجود ارتباط طردي قوي بين تقديرات الطالب في مادة الإحصاء ، ومادة الاقتصاد .

ملحوظة: - يمكن استخدام صيغة معامل ارتباط "اسبيرمان" في حساب الارتباط بين متغيرين كميين، حيث يتم استخدام رتب القيم التي يأخذها المتغير، ونترك للطالب القيام بحساب معامل ارتباط الرتب بين المساحة والكمية في مثال (5-1) السابق، وعليه أن يقوم بتفسير النتيجة: (معاونة :

$$(\sum d^2 = 148)$$

3/6 الانحدار الخطي البسيط Simple Regression

إن الغرض من استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط، هو دراسة وتحليل أثر متغير كمي على متغير كمي آخر، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- دراسة أثر كمية السماد على إنتاجية الدونم.
- دراسة أثر الإنتاج على التكلفة.
- دراسة أثر كمية البروتين التي يتناولها الأبقار على الزيادة في الوزن.
- أثر الدخل على الإنفاق الاستهلاكي.

وهكذا هناك أمثلة في كثير من النواحي الاقتصادية، والزراعية، والتجارية، والعلوم السلوكية، وغيرها من المجالات الأخرى.


1/3/6 نموذج الانحدار الخطي

في تحليل الانحدار البسيط، نجد أن الباحث يهتم بدراسة أثر أحد المتغيرين ويسمى بالمتغير المستقل أو المتنبأ منه، على المتغير الثاني ويسمى بالمتغير التابع أو المتنبأ به، ومن ثم يمكن عرض نموذج الانحدار الخطي في شكل معادلة خطية من الدرجة الأولى، تعكس المتغير التابع كدالة في المتغير المستقل كما يلي:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + e \quad (5-6)$$

حيث أن:

- y : هو المتغير التابع (الذي يتأثر)
- x : هو المتغير المستقل (الذي يؤثر)
- β_0 : هو الجزء المقطوع من المحور الرأسي y ، وهو يعكس قيمة المتغير التابع في حالة انعدام قيمة المتغير المستقل x ، أي في حالة $x = 0$
- β_1 : ميل الخط المستقيم $(\beta_0 + \beta_1 x)$ ، ويعكس مقدار التغير في y إذا تغيرت x بوحدة واحدة.
- e : هو الخطأ العشوائي، والذي يعبر عن الفرق بين القيمة الفعلية y ، والقيمة المقدرة $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ ، أي أن : $e = y - (\beta_0 + \beta_1 x)$ ، ويمكن توضيح هذا الخطأ على الشكل التالي لنقط الانتشار.



2/3/6 تقدير نموذج الانحدار الخطي البسيط

يمكن تقدير معاملات الانحدار (β_0, β_1) في النموذج (5-6) باستخدام طريقة المربعات الصغرى، وهذا التقدير هو الذي يجعل مجموع مربعات الأخطاء العشوائية $\sum e^2 = \sum (y - (\beta_0 + \beta_1 x))^2$ أقل ما يمكن، وبحسب هذا التقدير بالمعادلة التالية:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (6-1)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

حيث أن \bar{x} هو الوسط الحسابي لقيم x ، \bar{y} هو الوسط الحسابي لقيم y ، وتكون القيمة المقدرة للمتغير التابع هو: $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ ، ويطلق على هذا التقدير "تقدير معادلة انحدار y على x ".

مثال (3-6)

فيما يلي بيانات عن كمية البروتين اليومي بالجرام التي يحتاجها العجل الرضيع، ومقدار الزيادة في وزن العجل بالكجم، وذلك لعينة من العجول الرضية حجمها 10.


كمية البروتين	10	11	14	15	20	25	46	50	59	70
الزيادة في الوزن	10	10	12	12	13	13	19	15	16	20

والمطلوب :

- 1 -رسم نقط الانتشار، وما هو توقعاتك لشكل العلاقة ؟
- 2 -قدر معادلة انحدار الوزن على كمية البروتين.
- 3 -فسر معادلة الانحدار.
- 4 -ما هو مقدار الزيادة في الوزن عند إعطاء العجل 50 جرام من البروتين ؟ وما هو مقدار الخطأ العشوائي؟
- 5 -رسم معادلة الانحدار على نقط الانتشار في المطلوب (1) .

الحل

1 -رسم نقط الانتشار:



من المتوقع أن يكون لكمية البروتين أثر طردي (إيجابي) على مقدار الزيادة في الوزن.

2 -تقدير معادلة الانحدار.

بفرض أن x هي كمية البروتين، y هي مقدار الزيادة في الوزن، يمكن تطبيق المعادلتين في (6-6)، ومن ثم يتم حساب المجاميع التالية:

كمية البروتين x	الزيادة في الوزن y	$x y$	x^2
10	10	100	100
11	10	110	121
14	12	168	196
15	12	180	225
20	13	260	400
25	13	325	625
46	19	874	2116
50	15	750	2500
59	16	944	3481
70	20	1400	4900
320	140	5111	14664

المجاميع المطلوبة
$\sum x = 320$
$\sum y = 140$
$\sum xy = 5111$
$\sum x^2 = 14664$
إذا الوسط الحسابي:
$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{320}{10} = 32$
$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{140}{10} = 14$

- بتطبيق المعادلة الأولى في (6-6) يمكن حساب $\hat{\beta}_1$ كما يلي:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{(10)(5111) - (320)(140)}{(10)(14664) - (320)^2}$$

$$= \frac{6310}{44240} = 0.1426$$

- بتطبيق المعادلة الثانية في (6-6) يمكن حساب $\hat{\beta}_0$ كما يلي:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 14 - (0.1426)(32) = 9.4368$$

- إذا معادلة الانحدار المقدرة، هي:

$$\hat{y} = 9.44 + 0.143x$$

3 تفسير المعادلة:

- الثابت $\hat{\beta}_0 = 9.44$ يدل على أنه في حالة عدم استخدام البروتين في التغذية، فإن الوزن يزيد 9.44 كجم.
- معامل الانحدار $\hat{\beta}_1 = 0.143$ يدل على أنه كلما زادت كمية البروتين جرام واحد، حدث زيادة في وزن العجل بمقدار 0.143 كجم، أي زيادة مقدارها 143 جرام.

4 مقدار الزيادة في الوزن عند $x = 50$ هو:

$$\hat{y} = 9.44 + 0.143(50) = 16.59$$

وأما ومقدار الخطأ العشوائي هو:


$$\hat{e}_{x=50} = y_{x=50} - \hat{y}_{x=50} = 15 - 16.59 = -1.59$$

5 رسم معادلة الانحدار على نقط الانتشار.

يمكن رسم معادلة خط مستقيم إذا علم نقطتين على الخط المستقيم.

x	50	10
\hat{y}	16.59	10.87

إذا معادلة الانحدار هي:



x